

















Im/ Philo/ 2886 III

SBR 069027412390









D. IACOBI CHRISTIANI SCHAEFFER

ECCLESIAE EVANGELICAE RATISB. MINISTRI  
SERENISS. AC POTENTISS. REGIS DANIAE NORWEGIAE A CONSILIIS  
GYMN. ACAD. ALTON. PROFESS. PHIL. HONORAR.  
ACAD. CAES. NATVR. CVRIOS. IMPER. PETROPOL. REG. MAGN. BRITANN.  
ET NORWEG. ELECT. MONAC. ET MANNHEM.  
SOCIET. LITTER. LONDIN. BEROL. ROBORET. ET DVISBVRG.  
HIST. GOETTING. PHYS. BOTAN. FLORENT.  
OECON. BERN. ZELL. STYR. ET LVSAT. NEC NON PLVR. TEVTON. SODAL.  
ACADEM. PARIS. AB EPISTOLARUM COMMERCIO

F V N G O R V M

QVI IN

BAVARIA ET PALATINATV

CIRCA

RATISBONAM

NASCVNTVR

I C O N E S

NATIVIS COLORIBVS EXPRESSAE.

---

T O M V S T E R T I V S.

---

EDITIO SECVNDA.

IMPENSIS AVCTORIS.

---

RATISBONAE, MDCCLXXII.





KREISBIBLIOTHEK  
REGENSBURG

REGENSBURG

1713



AGARICI.

Blatterschwämme.



AGARICVS NONAGESIMVS.

Est fungus hydrophorus, tricolor, plerumque solitarius, fistulosus, carne destitutus, per aetatem varius; pileo ab initio cylindraceo, post campaniformi, ad oram fisso, lacerato, reuoluto, lineolis secundum longitudinem exarato; petiolo longo, cylindraceo, quasi contorto, radicem versus crassiori; velo & annulo destitutus. *Bauaris* nomen est nullum.

Fig. I. Fungus explicari incipiens; pileo campaniformi, oram versus fisso.

Fig. II. Par fungorum radicem versus connatorum: quorum maior explicatus, pileo ad oram reuoluto; minor explicari incipiens.

Fig. III. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.

Fig. IV. V. Pollen natius & vitro auctus.

Erklärung der zwey hundert und ersten Kupfertafel.

Der neunzigste Blatterschwamm.

Es ist solcher ein dreyfärbiger, meist einzelner, hohler, unfleischiger, und dem Alter nach abänderlicher Wasserschwamm; mit einem anfangs walzigen, nachhero glockigen, am Rande gespaltenen, zerrissenen, aufgerollten, und nach der Länge herab linirten, Hute; mit einem langen, runden, gleichsam gewundenen, und unten dickern, Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein sich entwickelnder Schwamm; mit glockigem, am Rande gespaltenem, Hute.

Fig. II. Ein paar unten zusammengewachsene Schwämme; davon der grössere entwickelt ist, und einen am Rande aufgerollten Hut hat; der kleinere aber sich zu entwickeln anfängt.

Fig. III. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche.

Fig. IV. V. Der natürliche und vergrösserte Saamenstaub.






Fig. I.

Fig. IV.

Fig. II.

Fig. V.

Fig. III.

St. Loibel pinx. R.

I. M. Fridrich sc. Rat.



Fig. III.



Fig. I.



Fig. II.




Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.





EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE SECVNDAE.

AGARICVS NONAGESIMVS PRIMVS.

Est fungus tricolor, solitarius, cauus, carne destitutus, parum varius; pileo tenui, campaniformi, acuminato, apice truncato; petiolo longo, tenui, recto vel curuato, fistuloso, ad radicem bulbofo; nec velum nec annulum habens. *Bauari* nomen nesciunt.

Fig. I. Fungus explicatus minor; pileo ad oram singulari modo formato, rotunde exciso & perforato.

Fig. II. Fungus explicatus maior; pileo ad oram lacerato.

Fig. III. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.

Fig. IV. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. V. VI. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zwey hundert und zwoten Kupfertafel.

Der ein und neunzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein dreyfärbiger, einzelner, hohler, unfleischiger, wenig abänderlicher, Schwamm; mit einem zarten, glockigen, spizig zulau- fenden und oben abgestuzten, Hute; mit einem langen, zarten, gera- den oder gekrümmten, hohlen und unten knolligen, Stiele; ohne Saamendecke und ohne Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein kleiner entwickelter Schwamm; mit einem am Rande sonderbar gebildeten, rundlich ausgeschnittenen und gelöcherten, Hute.

Fig. II. Ein grösserer entwickelter Schwamm; mit einem am Rande zerrissenen Hute.

Fig. III. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche.

Fig. IV. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. V. VI. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE TERTIAE.

AGARICVS NONAGESIMVS SECVNDVS.

Est fungus bicolor, solitarius, cauus, parum carnosus, varius; pileo ab initio globoso, post hemisphaerico, denique plano; petiolo cylindraceo, recto vel varie curvato, apice crassiori, radicibus tenuissimis saepe donato; annulo & velo carens. In *Bauaria* nomen deest.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo planiusculo; petiolo hinc inde curuato, radicato.

Fig. II. Fungus explicatus; pileo globoso; petiolo curuato.

Fig. III. Fungus explicatus; pileo in centro depresso; petiolo fere recto.

Fig. IV. Fungus explicatus; quoad faciem inferiorem.

Fig. V. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. VI. VII. Pollen natius & auctus.

Erklärung der zwey hundert und dritten Kupfertafel.

Der zwey und neunzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, einfacher, hohler, wenig fleischiger, abänderlicher, Schwamm; mit einem anfangs kugelrunden, nachhero halbrunden, und endlich flachen, Hute; mit einem runden, geraden und mannigfaltig gekrümmten, unten dicken und zart bewurzelten, Stiele; ohne Saamendecke und ohne Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit einem etwas flachen Hute; mit einem geschlängelten und bewurzelten Stiele.

Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; mit kugelrundem Hute und gekrümmtem Stiele.

Fig. III. Ein entwickelter Schwamm; mit einem in der Mitten vertieften Hute, und einem fast geraden Stiele.

Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche.

Fig. V. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. VI. VII. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VII.



Fig. VI.



St. L. pinx. R.

I. M. F. sc. R.

*Faint handwritten notes in Latin, including "A. ...", "St. L. pinx. R.", "H. ...", and "S. ...".*



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE QVINTAE.

AGARICVS NONAGESIMVS QVARTVS.

Est fungus bicolor, & simplex & multiplex, fistulosus, carne destitutus, varius; pileo ante explicationem conico, post eam campaniformi, plano, saepe fisso & lacerato; petiolo cylindraceo, ad radicem crassiori; velo, annulo, & nomine in *Bauaria*, nullo.

- Fig. I. Par fungorum ad radicem connatorum: quorum minor pileo conico, integro; maior campaniformi, fisso.  
Fig. II. Fasciculus fungorum, pileis variae explicationis.  
Fig. III. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.  
Fig. IV. Fungus ad perpendiculum dissectus.  
Fig. V. VI. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zwey hundert und fünften Kupfertafel.

Der vier und neunzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, so wohl einfacher, als vielfacher, hohler, unfleischiger, abänderlicher, Schwamm; mit einem vor der Entwicklung kegelligen, nach der Entwicklung glockigen, flachen, oft gespaltenen und zerrissenen, Hute; mit einem runden, nach unten zu dickern, Stiele; ohne Saamendecke, und ohne Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

- Fig. I. Ein Paar unten zusammengewachsene Schwämme; davon der kleinere einen kegelligen und ganzen, der grössere einen glockigen, gespaltenen, Hut hat.  
Fig. II. Ein Büschel Schwämme, mit Hüten von verschiedener Entwicklung.  
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche.  
Fig. IV. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.  
Fig. V. VI. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



Fig. I.



Fig. III.



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. VI.




Fig. V.



AGARICVS NONAGESIMVS SEXTVS.

Est fungus vnicolor, & simplex & multiplex, farctus, parum carnosus, varius; pileo ab initio globoso, post conico, campaniformi, plano, saepe infundibuliformi, integro vel fisso; petiolo cylindraceo, radicem versus & tenuiori & crassiori; velo & annulo carens. In *Bauaria* nomen habet nullum.

Fig. I. Fasciculus fungorum diuersae explicationis & figurae.

Fig. II. Fungus explicatus; pileo quasi tripetalo.

Fig. III. Par fungorum, quorum alter pileo plano, alter infundibuliformi.

Fig. IV. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.

Fig. V. Par fungorum vix explicatorum, multa aqua imbutorum, hinc colore mutato.

Fig. VI. VII. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zwey hundert und siebenden Kupfertafel.

Der sechs und neunzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher eineinfärbiger, sowohl einfacher, als vielfacher, voller, wenig fleischiger, abänderlicher, Schwamm; mit einem anfangs kugelrunden, nachhero kegelligen, glockigen, flachen, oft trichterigen, ganzen, oder gespaltenen, Hute; mit einem runden, nach unten zu bald dünnern, bald dickeren, Stiele. Ohne Saamendecke und Ring. Hat in *Bayern* keinen Namen.

Fig. I. Ein Büschel Schwämme von verschiedener Entwicklung und Aussehen.

Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; mit gleichsam dreyblättrigem Hute.

Fig. III. Ein Paar Schwämme; davon der eine einen flachen, der andere einen trichterförmigen, Hut hat.

Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche.

Fig. V. Ein Paar unentwickelte Schwämme, die von dem stark angesaugten Wasser die Farbe geändert haben.

Fig. VI. VII. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



Fig. I.




Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. V.



Fig. III.




Fig. II.



Fig. IV.





Fig. I.



Fig. IX.



Fig. VIII.



Fig. II.

Fig. IV.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig.

VII.

St. L. pinx. R.

I. G. F. sc. R.



AGARICVS NONAGESIMVS SEPTIMVS.

Est fungus unicolor, & simplex & multiplex, farctus, vix carnosus, valde varius & ex loco natali lignarius; pileo fere semper alio, plano, infundibuliformi, varie exciso & inciso; petiolo rotundo, inuerse conico, recto vel curuo; velo & annulo orbatus. In *Bauaria* nomine nullo.

Fig. I. Fungi variae figurae, ligno insidentes.

Fig. II. Fungus explicatus; pileo varie inciso.

Fig. III. Fungus praecedens, quoad faciem inferiorem.

Fig. IV. V. VI. VII. Fungi pileis perpendicularibus, incertae figurae.

Fig. VIII. IX. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert und achten Kupfertafel.

Der sieben und neunzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger, so wohl einfacher als vielfacher, voller, wenig fleischiger, sehr veränderlicher, Holzschwamm; mit einem fast allezeit andern, flachen, trichterförmigen, verschieden aus- und eingeschnittenen, Hute; mit einem runden, umgekehrt keglichen, geraden oder gekrümmten, Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Schwämme von verschiedener Gestalt, und wie sie dem Holze ansetzen.

Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; mit einem verschieden eingeschnittenen Hute.

Fig. III. Der vorige Schwamm, nach seiner Unterfläche.

Fig. IV. V. VI. VII. Schwämme mit senkrechten und verschieden gebildeten Hüten.

Fig. VIII. IX. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



AGARICVS NONAGESIMVS OCTAVVS.

Est fungus lignarius, bicolor, solitarius, farctus, carnosus, varius; pileo, ab initio conico, post campaniformi, denique plano, semper piloso; petiolo rotundo, semper fere curuo; velo membranaceo, & annulo saepe spurio donatus. In *Bauaria* nomine caret.

- Fig. I. Fungus explicatus; pileo fere plano, pilose-squamoso.  
Fig. II. Fungus difformis, fere tripetalus.  
Fig. III. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.  
Fig. IV. Fungus nondum explicatus; pileo conico; velo adhuc integro.  
Fig. V. Fungus ad perpendiculum dissectus.  
Fig. VI. VII. Pollen nativus & vitro auctus.

Erklärung der zwey hundert und neunten Kupfertafel.

Der acht und neunzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, einzelner, voller, fleischiger, abänderlicher, Holzschwamm; mit einem anfangs kegelligen, hernach glockigen, und endlich flachen, allezeit haarigen, Hute; mit einem runden, fast allezeit frumgebogenen, Stiele; mit einer häutigen Saamendecke, und einem manchmal unächten Ringe. Hat in Bayern keinen Namen.

- Fig. I. Ein entwickelter Schwamm, mit einem fast flachen, und haarigschuppigen, Hute.  
Fig. II. Ein ungestalteter, gleichsam dreyblätteriger, Schwamm.  
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche.  
Fig. VI. Ein noch unentwickelter Schwamm, mit kegeligem Hute und ganzer Saamendecke.  
Fig. V. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.  
Fig. VI. VII. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



Fig. I.



Fig. VI.




Fig. II.



Fig. III.




Fig. V.



Fig. IV.



St. L. pinx.



Fig. VII.

I.G.F.sc.R.





Fig. I.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. II.



Fig. III.

*St. Loibel pinx. R.*

*I. G. Friedrich sc. Rat.*



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE DECIMAE.

AGARICVS NONAGESIMVS NONVS.

Est fungus hydrophorus, bicolor, fistulosus, non carnosus, parum varius; pileo ab initio conico, post campaniformi, raro plano; petiolo longo, gracili, recto vel curuato; velo & annulo privatus. In *Bauaria* nomine gaudet nullo.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo conico, acuminato.

Fig. II. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.

Fig. III. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. IV. Pollen natiuus.

Fig. V. Pollen lente auctus.

Erklärung der zwey hundert und zehenden Kupfertafel.

Der neun und neunzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, hohler, unfleischiger, wenig abänderlicher, Wassertschwamm; mit einem anfangs kegelligen, nachher glockigen, sehr selten flachen, Hute; mit einem langen, dünnen, geraden, oder gekrümmten, Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit kegeligem und spitzig zulaufendem Hute.

Fig. II. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche.

Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. IV. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. V. Der vergrößerte Saamenstaub.



AGARICVS CENTESIMVS.

Est fungus hydrophorus, tenuis, fistulosus, vix carnosus, parum varius; pileo conico, post campaniformi, semper striis longitudinalibus notato; petiolo tenuiori, rotundo, recto vel varie curuato; nec velum nec anulum habens. *Bauari* nomen nesciunt.

- Fig. I. Fasciculus fungorum variae figurae & euolutionis.  
Fig. II. Fungus quoad faciem inferiorem.  
Fig. III. Fungus ad perpendicularum dissectus.  
Fig. IV. Pollen natiuus.  
Fig. V. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zwey hundert und eilften Kupfertafel.

Der hunderste Blatterschwamm.

Es ist solcher ein zarter, hohler, kaum fleischiger, wenig abänderlicher, Wasserschwamm; mit einem kegelligen, nachher glockigen, allezeit längs herunter linirten, Hute; mit einem zarten, runden, geraden, oder auf manche Art gebogenen, Stiele; ohne Saamendecke und Ring, auch ohne Namen in Bayern.

- Fig. I. Ein Büschel Schwämme von verschiedener Gestalt und Entwicklung.  
Fig. II. Ein Schwamm nach seiner Unterfläche.  
Fig. III. Ein Schwamm senkrecht zerschnitten.  
Fig. IV. Der natürliche Saamenstaub.  
Fig. V. Der vergrößerte Saamenstaub.



Fig. I.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. III.



Fig. II.



Fig. I.



Fig. VI.




Fig. V.



Fig. II.



Fig. III.



Fig.

IV.



AGARICVS CENTESIMVS PRIMVS.

Est fungus bicolor, fere unicolor, solitarius, farctus, non carnosus, parum varius; pileo prope semper infundibuliformi; petiolo rotundo, ad radicem crassiori; velo & annulo nullo. In *Bauaria* nomen deest.

- Fig. I. Fungus explicatus; pileo infundibuliformi.  
Fig. II. Fungus praecedens, quoad faciem inferiorem.  
Fig. III. Fungus explicatus; pileo planiusculo.  
Fig. IV. Fungus ad perpendiculum dissectus.  
Fig. V. Pollen natiuus.  
Fig. VI. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zwey hundert und zwölften Kupfertafel.

Der hundert und erste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, fast einfärbiger, einzelner, voller, unfleischiger, wenig abänderlicher, Schwamm; mit einem fast allezeit trichterigen Hute; mit einem runden, und unten dickern, Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

- Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit trichterigem Hute.  
Fig. II. Der vorige Schwamm, nach seiner Unterfläche.  
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm; mit fast flachem Hute.  
Fig. IV. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.  
Fig. V. Der natürliche Saamenstaub.  
Fig. VI. Der vergrößerte Saamenstaub.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE DECIMAE TERTIAE.

AGARICVS CENTESIMVS SECVNDVS.

Est fungus bicolor, fessilis, fere tremulans, non carnosus, incertissimae & semper variae figurae; velo & annulo carens. *Bauaris* nomen ignotum.

Fig. I. Fungus quasi alatus, seu aurem referens.

Fig. II. Fungus, quoad faciem inferiorem.

Fig. III — VIII. Varietates huius fungi.

Fig. IX. X. Pollen nativus & lente auctus.

Erklärung der zwey hundert und dreyzehenden Kupfertafel.

Der hundert und zwente Blatterschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, fast zitternder, unfleischiger, Schwamm, ohne Stiel und von gänzlich unbestimmter Gestalt. Hat weder Saamendecke, noch Ring, noch auch einen Namen in Bayern.

Fig. I. Ein gleichsam geflügelter oder ohrähnlicher Schwamm.

Fig. II. Ein Schwamm nach seiner Unterfläche.

Fig. III — VIII. Abänderungen dieses Schwammes.

Fig. IX. X. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. IX.




Fig. IV.



Fig. V.



Fig. III.




Fig. VII.



Fig. VI.



Fig. VIII.



Fig. X.





Fig. I.



Fig. V.



Fig. VI.

Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig.

II.



Fig. III.



Fig. IV.



I.G.F. sc. R.

St. L. pinæ R.



AGARICVS CENTESIMVS TERTIVS.

Est fungus bicolor, solitarius, farctus, carnosus, varius; pileo ab initio globoſo vel conico, poſt campaniformi, denique plano; petiolo rotundo, ad radicem caſſiori, recto vel curuato; nec velum, nec annulum, nec nomen in *Bauaria* habens.

Fig. I. Fungus, nondum explicatus; pileo fere globoſo.

Fig. II. Fungus explicatus; pileo plano.

Fig. III. IV. Fungi diuerſae explicationis & figurae.

Fig. V. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.

Fig. VI. Fungus ad perpendicularum diſſectus.

Fig. VII. VIII. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zwey hundert und vierzehenden Kupfertafel.

Der hundert und dritte Blätterschwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, einzelner, voller, fleiſchiger, abänderlicher, Schwamm; mit anfangs kugelrunden oder kegelligen, nachhero glockigen, endlich flachen, Hute; mit einem runden, unten dickern, geraden oder krummgebogenen, Stiele; hat weder Saamendecke, noch Ring, noch einen Namen in Bayern.

Fig. I. Ein noch unentwickelter Schwamm, mit faſt kugelrundem Hute.

Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; mit flachem Hute.

Fig. III. IV. Schwämme von verſchiedener Entwicklung und Geſtalt.

Fig. V. Ein entwickelter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.

Fig. VI. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.

Fig. VII. VIII. Der natürliche und vergrößerte Saamenſtaub.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE DECIMAE QVINTAE.

VARIETAS AGARICI CENTESIMI TERTII.

Haec fungi antecedentis varietas vere singularis est, & ad illustrandum fructificationis modum multum adiuuat.

Fig. I. Fungus maior, parum explicatus, cuius pileo minor explicatus insidet, interne velo cohaerent.

Fig. II. Fungus praecedens, ad perpendiculum dissectus.

Erklärung der zwey hundert und funfzehenden Kupfertafel.

Abänderung des hundert und dritten Blätterschwammes.

Diese Abänderung des vorhergehenden Schwammes ist sonderbar genug; und kann zur Erläuterung, wie die Schwämme sich oft fortpflanzen, vieles beytragen.

Fig. I. Ein grosser, wenig entwickelter Schwamm; dessen Hute ein anderer kleiner und entwickelter aufsteht, beyde aber innerlich nur einen Schwamm ausmachen.

Fig. II. Der vorige, aber senkrecht zerschnittene, Schwamm.











AGARICVS CENTESIMVS QVARTVS.

Est fungus hydrophorus, bicolor, plerumque solitarius, fistulosus, carne destitutus, per aetatem varius; pileo ab initio fusiformi, post conico, denique campaniformi variis modis ad oram lacerato seu reuoluto, semper lineolis secundum longitudinem exarato; petiolo cylindraceo, vel recto, vel curuato, ad basin crassiori; velo & annulo destitutus. Nomen in *Bauaria* nullum.

Fig. I. Par fungorum; quorum minor nondum explicatus, pileo integro; maior explicatus, pileo campaniformi, fisso & lacerato.

Fig. II. Par fungorum; quorum minor explicari incipiens, pileo conico; maior explicatus, pileo campaniformi, ad oram reuoluto.

Fig. III. Fungus, pileo campaniformi, ad oram reuoluto; petiolo basin versus crassiori.

Fig. IV. V. Fungi variae explicationis.

Fig. VI. VII. Pollen nativus & lente auctus.

Erklärung der zweyhundert und sechzehenden Kupfertafel.

Der hundert und vierte Blätterschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, meistentheils einfacher, hohler, unfleischiger, in der Zeitfolge veränderlicher, Wasserschwamm; mit einem anfangs spindelförmigen, hierauf kegelligen, und endlich glockigen, am Rande auf mancherley Art zerrissenen oder aufgerollten, allezeit längs herunter gestrichelten, Hute; mit rundem, geradem, oder gebogenem, und nach unten zu dickerem, Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein Paar Schwämme, davon der kleine noch unentwickelt, mit ganzem Hute; der grössere entwickelt, mit glockigem, gespaltenem und zerrissenem, Hute.

Fig. II. Ein Paar Schwämme, davon der kleinere sich zu entwickeln anfänget, mit kegelligem Hute; der grössere sich entwickelt hat, mit glockigem und am Rande aufgerolltem Hute.

Fig. III. Ein Schwamm mit glockigem, am Rande aufgerolltem, Hute; mit einem unten dickern Stiele.

Fig. IV. V. Schwämme von verschiedener Entwicklung.

Fig. VI. VII. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



AGARICVS CENTESIMVS QVINTVS.

Est fungus bicolor, plerumque solitarius, farctus, carnosus, parum varius; pileo campanulato; petiolo cylindraceo, recto, interdum curuato, ad basin crassiusculo; velo araneoso, annuloque tenuiori praeditus. *Bauaris* nomen deest.

- Fig. I. Par fungorum; quorum minor nondum euolutus, maior explicatus.  
Fig. II. Fungus explicatus, pileo campaniformi, petiolo annulato.  
Fig. III. Fungus explicari incipiens; velo araneoso, paullulum lacerato.  
Fig. IV. Fungus euolutus, quoad faciem inferiorem.  
Fig. V. Fungus ad perpendiculum dissectus.  
Fig. VI. Pollen natiuus.  
Fig. VII. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert und siebenzehenden Kupfertafel.

Der hundert und fünfte Blatterschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, meistens einfacher, voller, fleischiger, wenig veränderlicher, Schwamm; mit einem glockenförmigen, Hute; mit einem runden, geraden, bisweilen gebogenen, und unten dickeren, Stiele; mit einer spinnenwebigen Saamendecke und zarten Ringe. Ohne Namen in Bayern.

- Fig. I. Ein Paar Schwämme, davon der kleinere unentwickelt, der andere entwickelt ist.  
Fig. II. Ein entwickelter Schwamm, mit glockigem Hute, und beringeltem Stiele.  
Fig. III. Ein Schwamm, der sich zu entwickeln anfängt, und dessen spinnenwebige Saamendecke etwas aufgesprungen ist.  
Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm; nach seiner Unterfläche.  
Fig. V. Ein Schwamm senkrecht zerschnitten.  
Fig. VI. Der natürliche Saamenstaub.  
Fig. VII. Der vergrößerte Saamenstaub.



Fig. I.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. III.



Fig. II.

Fig. IV.

Fig. V.







Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.

Fig. V.



Fig. VI.





AGARICVS CENTESIMVS SEXTVS.

Est fungus bicolor, solitarius, farctus, carnosus, parum varius; pileo ab initio globoso, post conico, denique plano; petiolo cylindraceo ad basin crassiori seu tuberoso; velo & annulo priuatus. Nomine in *Bauaria* nullo.

Fig. I. Fungus explicari incipiens; pileo fere globoso.

Fig. II. Fungus explicatus; pileo planiusculo.

Fig. III. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.

Fig. IV. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. V. Pollen natiuus.

Fig. VI. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert und achtzehenden Kupfertafel.

Der hundert und sechste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, einfacher, voller, fleischiger, wenig abänderlicher Schwamm; mit einem anfangs kugelrunden, nachmals halbrunden, endlich flachen Hute; mit rundem, nach unten zu dickerm, knolligem Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein sich entwickelnder Schwamm; mit fast kugelrundem Hute.

Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; mit flachem Hute.

Fig. III. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche.

Fig. IV. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. V. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. VI. Der vergrößerte Saamenstaub.



AGARICVS CENTESIMVS SEPTIMVS.

Est fungus tricolor, solitarius, farctus, carnosus, varius; pileo ab initio globoso vel conico, post campaniformi seu plano, saepe in centro fastigiato; petiolo cylindraceo, basin versus crassiori; nec velo nec annulo donatus. In *Bauaria* nomen habet nullum.

Fig. I. Fungus paullulum explicatus; pileo conico.

Fig. II. Fungus nondum explicatus; pileo reniformi.

Fig. III. Fungus nondum explicatus; pileo globoso.

Fig. IV. Fungus explicatus; pileo plano in centro fastigiato.

Fig. V. Fungus explicatus; quoad faciem inferiorem.

Fig. VI. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. VII. Pollen natiuus.

Fig. VIII. Pollen lente auctus.

Erklärung der zweyhundert und neunzehenden Kupfertafel.

Der hundert und siebende Blätterschwamm.

Es ist solcher ein dreysfärbiger, einfacher, voller, fleischiger, abänderlicher Schwamm; mit einem anfangs kugelrunden, oder kegelligen, nachher glockigen, oder flachen, und in der Mitten oft zugespizten Hute; mit einem runden, nach unten zu sich verdickenden Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in *Bayern* keinen Namen.

Fig. I. Ein etwas entwickelter Schwamm; mit kegeligem Hute.

Fig. II. Ein unentwickelter Schwamm; mit nierenähnlichem Hute.

Fig. III. Ein unentwickelter Schwamm; mit kugelrundem Hute.

Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm; mit flachem und in der Mitte zugespiztem Hute.

Fig. V. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche.

Fig. VI. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. VII. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. VIII. Der vergrößerte Saamenstaub.









Fig. I.

Fig. IV.



Fig. V.



Fig. II.



Fig. III.



AGARICVS CENTESIMVS OCTAVVS.

Est fungus fere vnicolor, solitarius & multiplex, fistulosus, vix carnosus, parum varius; pileo ab initio conico, post campanulato, in centro fastigiato; petiolo cylindraceo, basin versus crassiori; nec velum, nec annulum habens. Nomen in *Bauaria* deest.

Fig. I. Par fungorum explicatorum; pileo campanulato, fastigiato.

Fig. II. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.

Fig. III. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. IV. Pollen natiuus.

Fig. V. Pollen lente auctus.

Erklärung der zweyhundert und zwanzigsten Kupfertafel.

Der hundert und achte Blatterschwamm.

Es ist solcher ein fast einfärbiger, sowohl einfacher, als vielfacher, hohler, kaum fleischiger, wenig abänderlicher, Schwamm; mit einem anfänglich kegelligen, nachher glockigen, und in der Mitten spizig auslaufenden, Hute; mit einem runden, nach unten zu dickern Stiele; ohne Saamendecke und Ring, auch ohne Namen in Bayern.

Fig. I. Ein Paar entwickelte Schwämme; mit glockigem und zugespitztem Hute.

Fig. II. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche.

Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. IV. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. V. Der vergrößerte Saamenstaub.



AGARICVS CENTESIMVS NONVS.

Est fungus bicolor, solitarius, farctus, carnosus, varius; pileo ab initio semiglobofo vel conico, post campanulato, denique plano, saepe deformi; petiolo cylindraceo, recto vel curuato, basi crasso; velo spurio, annulo nullo. *Bauari* nomen nesciunt.

- Fig. I. Fungus nondum euolutus; pileo fere globofo.  
Fig. II. Fungus nondum explicatus; pileo conico, velo spurio.  
Fig. III. Fungus explicatus; pileo plano.  
Fig. IV. Fungus pileo deformi.  
Fig. V. Fungus quoad faciem inferiorem,  
Fig. VI. Fungus ad perpendiculum dissectus.  
Fig. VII. VIII. Pollen natius & auctus.

Erklärung der zweyhundert ein und zwanzigsten Kupfertafel.

Der hundert und neunte Blätterschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, einfacher, voller, fleischiger, abänderlicher, Schwamm; mit einem anfangs halbrunden oder kegelligen, nachmals glockigen, endlich flachen, oft ungestalteten Hute; mit einem runden, geraden oder gebogenen, unten dickern Stiele; mit einer unächten Saamendecke, aber ohne Ring, auch ohne Namen in Bayern.

- Fig. I. Ein noch unentwickelter Schwamm, mit fast kugelförmigem Hute.  
Fig. II. Ein noch unentwickelter Schwamm, mit kegelförmigem Hute und unächter Saamendecke.  
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm, mit flachem Hute.  
Fig. IV. Ein Schwamm mit ungestaltetem Hute.  
Fig. V. Ein Schwamm nach der Unterfläche.  
Fig. VI. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.  
Fig. VII. VIII. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.







Fig. III.



Fig. IV.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.





AGARICVS CENTESIMVS DECIMVS.

Est fungus minimus, bicolor, fistulosus, non carnosus; pileo conico, post campanulato; petiolo longo, cylindraceo, radicato; velo & annulo orbatus. *Bauaris* nomen deest.

Fig. I. Fungus nondum explicatus; pileo conico.

Fig. II. Fungus explicatus, pileo campanulato.

Fig. III. Fungus vitro auctus, nondum explicatus.

Fig. IV. Fungus vitro auctus, quoad faciem inferiorem.

Fig. V. Fungus vitro auctus, ad perpendiculum dissectus.

Fig. VI. VII. Pollen lente auctus.

Erklärung der zweyhundert zwey und zwanzigsten Kupfertafel.

Der hundert und zehende Blätterschwamm.

Es ist solcher ein sehr kleiner, zweyfärbiger, hohler, unfleischiger Schwamm; mit einem anfangs kegelligen, nachmals glockigen Hute; mit einem langen, runden, bewurzelten Stiele; hat weder eine Saamendecke, noch einen Ring, noch einen Namen in Bayern.

Fig. I. Ein noch unentwickelter Schwamm; mit kegeligem Hute.

Fig. II. Ein noch unentwickelter Schwamm; mit glockigem Hute.

Fig. III. Ein vergrößerter unentwickelter Schwamm.

Fig. IV. Ein vergrößerter Schwamm; nach seiner Unterfläche.

Fig. V. Ein vergrößerter senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. VI. VII. Der vergrößerte Saamenstaub.



AGARICVS CENTESIMVS VNDECIMVS.

Est fungus unicolor, seu bicolor, farctus, carnosus, varius; petiolo campanulato, saepe deformi; petiolo cylindraceo, recto vel varie curuato, striato, saepe lacerto & squamoso; nullo velo, nullo annulo. *Bauaris* anonymus.

Fig. I. Par fungorum, diuersae magnitudinis & figurae.

Fig. II. Fungus deformis.

Fig. III. Fungus quoad faciem inferiorem.

Fig. IV. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. V. Pollen nativus.

Fig. VI. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert drey und zwanzigsten Kupfertafel.

Der hundert und eilfte Blatterschwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger, oder zweyfärbiger, fleischiger, abänderlicher, Schwamm; mit einem glockigen, oft ungestalteten, Hute; mit einem runden, geraden, oder auf mancherley Art gekrümmten, oft zerrissenen und schuppigen Stiele; ohne Saamendecke und Ring, auch ohne Namen in Bayern.

Fig. I. Ein Paar Schwämme, von verschiedener Grösse und Gestalt.

Fig. II. Ein ungestalteter Schwamm.

Fig. III. Ein Schwamm nach seiner Unterfläche.

Fig. IV. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. V. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. VI. Der vergrößerte Saamenstaub.





Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.

Fig. V.



Fig. VI.





1w2 petaloides aff.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IX.



Fig. X.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.





AGARICVS CENTESIMVS DVODECIMVS.

Est fungus bicolor, fere unicolor, solitarius, vix carnosus, varius; pileo plerumque infundibuliformi, tremulante, saepe florem referente, deformi, lacerato; petiolo breui, rotundo, ad radicem plerumque tenuiori; nullo velo nulloque annulo. *Bauari* nomen ignorant.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo infundibuliformi.

Fig. II. Idem fungus, quoad faciem inferiorem.

Fig. III. Par fungorum, pileis connatorum.

Fig. IV. V. Fungi deformes.

Fig. VI. VII. Fungi flabellum aemulantes.

Fig. VIII. Fungus ad perpendicularum dissectus.

Fig. IX. X. Pollen natiuus & lente auctus.

Erklärung der zweyhundert vier und zwanzigsten Kupfertafel.

Der hundert und zwölfte Blatterschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, fast einfärbiger, einzelner, wenig fleischiger, abänderlicher Schwamm; mit einem meist trichterförmigen, zitternden, oft blumenartigen, ungestalten, zerrissenen Hute; mit einem kurzen, runden, und unten mehrentheils dünnern Stiele; ohne Saamendecke und Ring, auch ohne Namen in Bayern.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit einem trichterförmigen Hute.

Fig. II. Eben derselbe Schwamm, nach der Unterfläche.

Fig. III. Ein Paar Schwämme, welche mit den Hüten zusammen gewachsen sind.

Fig. IV. V. Ungestaltete Schwämme.

Fig. VI. VII. Schwämme, welche einem Sonnensächer gleich sehen.

Fig. VIII. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. IX. X. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE VICESIMAE QVINTAE.

AGARICVS CENTESIMVS DECIMVS  
TERTIVS.

Est fungus vnicolor, plerumque solitarius, farctus, carnosus, parum varius; pileo plano, pilose-squamoso; petiolo crasso, rotundo, basin versus tenuiori; nec velo nec annulo donatus. *Bavaris* anonymus.

- Fig. I. Par fungorum, petiolo connatorum.  
Fig. II. Idem par fungorum, quoad faciem inferiorem.  
Fig. III. Particula pilei ad perpendiculum dissecti.  
Fig. IV. Pollen nativus.  
Fig. V. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert fünf und zwanzigsten Kupfertafel.

Der hundert und dreyzehende Blätterschwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger, meistens einzelner, voller, fleischiger, wenig abänderlicher, Schwamm; mit einem flachen, haarigschwammigen Hute; einem dicken, runden, nach unten zu dünnern Stiele; ohne Saamendecke, ohne Ring, auch ohne Namen in Bayern.

- Fig. I. Ein Paar Schwämme, welche am Stiele zusammen gewachsen sind.  
Fig. II. Eben dasselbe Paar Schwämme, nach der Unterfläche.  
Fig. III. Ein Stückgen senkrecht zerschnittenen Schwammes.  
Fig. IV. Der natürliche Saamenstaub.  
Fig. V. Der vergrößerte Saamenstaub.



Fig. I.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. III.



Fig. II.





Fig. IV.



Fig. V.





EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE VICESIMAE SEXTAE.

AGARICVS CENTESIMVS DECIMVS  
QVARTVS.

Est fungus vnicolor, solitarius, fistulosus, vix carnosus, varius; pileo ab initio conico, post campaniformi, denique plano; petiolo tenui, rotundo, recto vel hinc inde curuato; velo & annulo carens. *Bauaris* nomen nullum.

Fig. I. Trias fungorum, variæ euolutionis & figurae.

Fig. II. Fungus quoad faciem inferiorem.

Fig. III. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. IV. Pollen natiuus.

Fig. V. Pollen lente auctus.

Erklärung der zweyhundert sechs und zwanzigsten Kupfertafel.

Der hundert und vierzehende Blatterschwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger, einzelner, hohler, wenig fleischiger, abänderlicher Schwamm; mit einem anfangs kegelligen, nachhero glozigen zuletzt flachen Hute; mit einem dünnen, runden, geraden oder geschlängelt gekrümmten Stiele; ohne Saamendecke und Ring. In Bayern hat er keinen besondern Namen.

Fig. I. Drey Schwämme von verschiedener Entwicklung und Gestalt.

Fig. II. Ein Schwamm nach der Unterfläche.

Fig. III. Ein Schwamm senkrecht zerschnitten.

Fig. IV. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. V. Der vergrößerte Saamenstaub.



AGARICVS CENTESIMVS DECIMVS  
QVINTVS.

Est fungus unicolor, vel bicolor, plerumque solitarius, fistulosus, parum carnosus, varius; pileo ab initio glo-  
bofo, post planiusculo, faepe infundibuliformi, semper  
pilofo; petiolo vel recto, vel ad radicem crassiori, vel  
inuerse conico; velo spurio, sed annulo & nomine in  
*Bauaria* nullo.

- Fig. I. Fungus explicatus; pileo infundibuliformi; petiolo inuerse conico.  
Fig. II. Par fungorum, diuersae explicationis.  
Fig. III. Fungus nondum explicatus.  
Fig. IV. Fungus nondum explicatus, quoad faciem inferiorem.  
Fig. V. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem, vbi *a* guttulae lacteae.  
Fig. VI. VII. Fungi ad perpendiculum dissecti.  
Fig. VIII. IX. Pollen natiuus & lente auctus.

Erklärung der zweyhundert sieben und zwanzigsten Kupfertafel.

Der hundert und funfzehende Blätterschwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger, oder zweyfärbiger, meist einzelner, hohler,  
wenig fleischiger, abänderlicher Schwamm; mit einem anfänglich  
kugelrunden, nachhero flachen, oft trichterförmigen, allezeit haarigen  
Hute; mit einem geraden, unten dickern oder umgekehrt kegelligen  
Stiele; mit einer unächten Saamendecke, aber ohne Ring und ohne  
Namen in Bayern.

- Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit einem trichterförmigen Hute, und umgekehrt  
kegelligen Stiele.  
Fig. II. Ein Paar Schwämme, von verschiedener Entwicklung.  
Fig. III. Ein noch unentwickelter Schwamm  
Fig. IV. Ein noch unentwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche.  
Fig. V. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche und wo *a* die milchigen  
Safttropfen.  
Fig. VI. VII. Senkrecht zerschnittene Schwämme.  
Fig. VIII. IX. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



Fig. I.



Fig. VIII.




Fig. V.



Fig. VII.



Fig. II.



Fig. IX.



Fig. VI.



Fig. III.



Fig. IV.



S.L.p.R.

I.G.F.sc.R.



Fig. I.



Fig. III.



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. X.



Fig. IX.



Fig. VII.



Fig. VIII.

Fig. V.



Fig. VI.





AGARICVS CENTESIMVS DECIMVS  
SEXTVS.

Est fungus vnicolor, solitarius, farctus, carnosus, varius, succo lacteo turgens; pileo ab initio globoso, post plano, piloso, in centro saepe depresso seu infundibuliformi; petiolo breui, rotundo, recto, vel curuato, ad basin modo crassiori, modo tenuiori; velo spurio, sed annulus desideratur. In *Bauaria* nomine gaudet nullo.

- Fig. I. Fungus nondum euolutus; pileo globoso.  
Fig. II. Fungus explicari incipiens; pileo in centro depresso.  
Fig. III. Fungus praecedens, quoad faciem inferiorem, velumque spurium exhibens.  
Fig. IV. Fungus explicatus; pileo valde piloso & in centro depresso.  
Fig. V. VI. Fungi variae figurae.  
Fig. VII. Fungus quoad faciem inferiorem, cum guttulis lacteis.  
Fig. VIII. Fungus ad perpendiculum dissectus.  
Fig. IX. X. Pollen natius & auctus.

Erklärung der zweyhundert acht und zwanzigsten Kupfertafel.

Der hundert und sechzehende Blatterschwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger, einzelner, voller, fleischiger, abänderlicher, Milchschwamm; mit einem anfangs kugelrunden, nachher flachen, haarigen, in der Mitten vertieften oder trichterigen Hute; mit einem kurzen, runden, geraden oder gekrümmten, nach unten zu bald dickern, bald dünnern Stiele; mit einer unächten Saamendecke, aber ohne Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

- Fig. I. Ein noch unentwickelter Schwamm; mit kugelrundem Hute.  
Fig. II. Ein sich entwickelnder Schwamm; mit einem in der Mitte vertieften Hute.  
Fig. III. Der vorige Schwamm; nach seiner Unterfläche und unächten Saamendecke.  
Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm; mit einem sehr haarigen und in der Mitte vertieften Hute.  
Fig. V. VI. Schwämme von verschiedener Gestalt.  
Fig. VII. Ein Schwamm, nach seiner Unterfläche, und mit den milchigen Safttropfen.  
Fig. VIII. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.  
Fig. IX. X. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE VICESIMAE NONAE.

AGARICVS CENTESIMVS DECIMVS  
SEPTIMVS.

Est fungus tricolor, solitarius, fistulosus, minime carnosus, parum varius; pileo plicato, conico, acuminato; petiolo rotundo, recto vel varie curuato; velo & annulo carens. In *Bauaria* nomen nullum.

Fig. I. Par fungorum euolutorum; petiolo infra conatorum.

Fig. II. Fungus quoad faciem inferiorem.

Fig. III. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. IV. Pollen natiuus.

Fig. V. Pollen lente auctus.

Erklärung der zweyhundert neun und zwanzigsten Kupfertafel.

Der hundert und siebenzehende Blatterschwamm.

Es ist solcher ein dreyfärbiger, einzelner, hohler, unfleischiger, wenig abänderlicher Schwamm; mit einem faltigen, kegelligen, zugespitzten Hute; mit einem runden, geraden oder verschieden gekrümmten Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein Paar entwickelte Schwämme; welche unten am Stiele zusammengewachsen sind.

Fig. II. Ein Schwamm nach der Unterfläche.

Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. IV. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. V. Der vergrößerte Saamenstaub.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.





Fig. V.









EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE TRICESIMAE.

AGARICVS CENTESIMVS DECIMVS  
OCTAVVS.

Est fungus vnicolor, & simplex & multiplex, farctus, minime carnosus, varius; pileo plicato, conico, campaniformi, plano; petiolo tenuiori, recto vel curuato; velo & annulo carens. *Bauaris* nomen nullum.

Fig. I. Fasciculus fungorum, variae evolutionis & figurae.

Fig. II. Par fungorum, petiolis ad radicem connatis.

Fig. III. Fungus explicatus; pileo conico.

Fig. IV. V. Fungi variae euolutionis.

Fig. VI. Fungus quoad faciem inferiorem.

Fig. VII. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. VIII. IX. Pollen natius & auctus.

Erklärung der zweyhundert und dreyßigsten Kupfertafel.

Der hundert und achtzehende Blätterschwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger, sowohl einfacher, als vielfacher, voller, gar nicht fleischer, abänderlicher Schwamm; mit einem faltigen, kegelligen, glockenförmigen, flachen Hute; mit einem zarten, geraden und gebogenen Stiele; ohne Saamendecke, ohne Ring, und ohne Namen in Bayern.

Fig. I. Ein Büschel Schwämme, von verschiedener Entwicklung und Gestalt.

Fig. II. Ein Paar mit dem Stiele zusammengewachsene Schwämme.

Fig. III. Ein entwickelter Schwamm; mit kegeligem Hute.

Fig. IV. V. Schwämme von verschiedener Entwicklung.

Fig. VI. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche.

Fig. VII. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. VIII. IX. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE TRICESIMAE PRIMAE.

AGARICVS CENTESIMVS DECIMVS  
NONVS.

Est fungus unicolor, sessilis, & lignarius & lignosus, variae  
& incertissimae figurae. *Bavaris* nomen ignorum.

Fig. I. Fungus quoad faciem superiorem & inferiorem.

Fig. II. Pollen nativus.

Fig. III. Pollen lente auctus.

Erklärung der zweyhundert ein und dreyßigsten Kupfertafel.

Der hundert und neunzehende Blatterschwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger, stielloser, harter Holzschwamm, von  
einer stets abänderlichen und höchst unbestimmten Gestalt. Hat  
in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein Schwamm nach seiner Ober- und Unterfläche.

Fig. II. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. III. Der vergrößerte Saamenstaub.



Fig. I.



Fig. II.




Fig. III.



St. L. p. R.

I. G. F. sc. R.





Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.




Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. V.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE TRICESIMAE  
SECVNDAE.

AGARICVS CENTESIMVS VICESIMVS.

Est fungus vnicolor, solitarius, fistulosus, non carnosus, parum varius; pileo plano, ad oram plicato; petiolo cylindraceo, recto vel curuato; velo, annulo, & nomine in *Bauaria*, destitutus.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo plano, infundibuliformem aemulante.

Fig. II. Fungus explicatus; deformis.

Fig. III. Fungus quoad faciem inferiorem.

Fig. IV. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. V. VI. Pollen natiuus & vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert zwey und dreyßigsten Kupfertafel.

Der hundert und zwanzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger, einzelner, hohler, unfleischiger Schwamm; mit einem flachen, am Rande gefalteten Hute; mit einem runden, geraden oder krumgebogenen Stiele; ohne Saamendecke und Ring, auch ohne Namen in Bayern.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit flachem, und gleichsam trichterförmigem Hute.

Fig. II. Ein entwickelter ungestalteter Schwamm.

Fig. III. Ein Schwamm nach seiner Unterfläche.

Fig. IV. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. V. VI. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



AGARICVS CENTESIMVS VICESIMVS PRIMVS.

Est fungus lignarius, bicolor, solitarius, farctus, carnosus, valde varius; pileo squamoso, fere semper alio, semicirculari, reniformi, oblongo; petiolo inuerse conico, breuiori, longiori; velo & annulo carens.. In *Bauaria* nomen habet nullum.

- Fig. I. Fungus euolutus; pileo oblongo.  
Fig. II. Fungus euolutus; pileo reniformi.  
Fig. III. Fungus quoad faciem inferiorem.  
Fig. IV. Fungus ad perpendiculum dissectus.  
Fig. V. Pollen natiuus.  
Fig. VI. Pollen lente auctus.

Erklärung der zweyhundert drey und dreyßigsten Kupfertafel.

Der hundert ein und zwanzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, einzelner, voller, fleischiger, sehr abänderlicher Holzschwamm; mit einem schuppigen, fast allezeit halbrunden, nierenförmigen, länglichen, Hute; mit einem umgekehrt kegelförmigen, bald längern, bald kürzern Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

- Fig. I. Ein entwickelter Schwamm, mit länglichem Hute.  
Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; mit nierenförmigem Hute.  
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche.  
Fig. IV. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.  
Fig. V. Der natürliche Saamenstaub.  
Fig. VI. Der vergrößerte Saamenstaub.



Fig. I.




Fig. II.



Fig. III.




Fig. IV.





Fig. V.



Fig. VI.









EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE TRICESIMAE QVARTAE.

AGARICVS CENTESIMVS VICESIMVS  
SECVNDVS.

Est fungus unicolor, solitarius, farctus, vix carnosus, parum varius; pileo conico seu campaniformi, in centro semper acuminato; petiolo tenui, cylindraceo, plerumque varie curuato, ad radicem bulbofo; nec velum, nec annulum, nec nomen in *Bauaria*, habens.

Fig. I. II. Fungi explicati; pileis campaniformibus.

Fig. III. Fungus explicatus; pileo conico.

Fig. IV. Fungus quoad faciem inferiorem.

Fig. V. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. VI. VII. Pollen natius & auctus.

Erklärung der zweyhundert vier und dreyßigsten Kupfertafel.

Der hundert zwey und zwanzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger, einzelner, voller, wenig fleischiger, und wenig abänderlicher Schwamm; mit einem kegelligen oder flockigen, in der Mitten allezeit zugespizten Hute; mit einem dünnen, meist geschlängelten, unten knolligen Stiele; ohne Saamendecke und Ring, auch ohne Namen in Bayern.

Fig. I. II. Entwickelte Schwämme; mit glockigen Hüten.

Fig. III. Ein entwickelter Schwamm; mit kegelligem Hute.

Fig. IV. Ein Schwamm, nach seiner Unterfläche.

Fig. V. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. VI. VII. Der natürlichz und vergrößerte Saamenstaub.



AGARICVS CENTESIMVS VICESIMVS TERTIVS.

Est fungus bi- vel tricolor, lacteus, farctus, carnosus varius; pileo ab initio globoso, post campaniformi, denique plano, variis lineis concentricis picto; petiolo cylindraceo, recto vel curuato; nec velo, nec annulo, nec nomine in *Bauaria*, gaudens.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo campaniformi.

Fig. II. Fungus explicatus; pileo deformi.

Fig. III. Fungus explicatus; pileo fero plano.

Fig. IV. Fungus nondum explicatus; pileo globoso.

Fig. V. Fungus multa aqua imbutus, hinc colore mutato.

Fig. VI. Fungus quoad faciem inferiorem, vbi *a.* guttulae lacteae

Fig. VII. Fungus ad perpendicularum dissectus.

Fig. VIII. IX. Pollen natius & auctus.

Erklärung der zweyhundert fünf und dreyßigsten Kupfertafel.

Der hundert drey und zwanzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein zwey- oder dreyfärbiger, voller, fleischiger, abänderlicher Milchschwamm; mit einem anfangs kugelrunden, nachhero glockigen, und endlich flachen Hute; mit einem meist runden, geraden oder gebogenen Stiele, ohne Saamendecke und Ring, auch ohne Namen in Bayern.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit glockigem Hute.

Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; mit aufgerolltem Hute.

Fig. III. Ein entwickelter Schwamm; mit flachem Hute.

Fig. IV. Ein noch unentwickelter Schwamm; mit kugelrundem Hute.

Fig. V. Ein von Wasser stark angesaugter Schwamm, und von dunkler Farbe.

Fig. VI. Ein Schwamm nach seiner Unterfläche, wo *a.* die Milchtropfen.

Fig. VII. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. VIII. IX. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



Fig. I.



Fig. VII.



Fig. II.



Fig. IX.



Fig. VI.



Fig. VIII.



Fig. III.



Fig. IV.





Fig. V.



Libl pinx. et Sc. Rat.







AGARICVS CENTESIMVS VICESIMVS QVARTVS.

Est fungus unicolor, solitarius, fistulosus, non carnosus, varius; pileo globoso, post campaniformi, in centro rotundo, vel acuminato; pileo gracili, varie plerumque curuato; nec velum, nec annulum, nec nomen in *Bauaria*, habens.

Fig. I. Fungus explicatus, aqua imbutus; pileo campaniformi.

Fig. II. Fungus explicatus; pileo colore naturali.

Fig. III. — VII. Fungi varie explicationis & figurae.

Fig. VIII. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. IX. X. Pollen nativus & vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert sechs und dreyßigsten Kupfertafel.

Der hundert vier und zwanzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger, einzelner, hohler, unfleischiger, abänderlicher Schwamm; mit einem kugelrunden, nachher glockigen, in der Mitte gerundeten oder zugespizten Hute; mit einem zarten, gebogenen und geschlängelten, Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein entwickelter und mit Wasser stark beschwangerter Schwamm; mit glockigem Hute.

Fig. II. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner natürlichen Farbe.

Fig. III. — VII. Schwämme von verschiedenen Entwicklungen und Aussehen.

Fig. VIII. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. IX. X. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE TRICESIMAE SEPTIMAE.

AGARICVS CENTESIMVS VICESIMVS  
QVINTVS.

Est fungus lignarius, tricolor, & simplex & multiplex, fistulosus, non carnosus, varius; pileo ab initio conico, post campaniformi, denique plano; petiolo cylindraceo, recto vel curuo, ab basin crassiori; velo, annulo, & nomen in *Bauaria*, orbatus.

Fig. I. Fungi variae explicationis & figurae.

Fig. II. Fungus, quoad faciem inferiorem.

Fig. III. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. IV. Pollen natiuus.

Fig. V. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert sieben und dreyßigsten Kupfertafel.

Der hundert fünf und zwanzigste Blatterschwamm.

Es ist solcher ein dreyfärbiger, theils einfacher, theils vielfacher, hohler, unfleischiger, abänderlicher Holzschwamm; mit einem anfangs festgeligen, nachher flockigen, und endlich flachen Hute; mit einem runden, geraden oder gebogenen, und unten dickern Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Schwämme von verschiedener Entwicklung und Gestalt.

Fig. II. Ein Schwamm, nach seiner Unterfläche.

Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. IV. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. V. Der vergrößerte Saamenstaub.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.

Fig. V.



Fig. IV.






Fig. I.



Fig. VII.



Fig. VI.



Fig. II.



Fig.

IV.



Fig. III.



Fig. V.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE TRICESIMAE OCTAVAE.

## AGARICVS CENTESIMVS VICESIMVS SEXTVS.

Est fungus vnicolor, solitarius, farctus, parum carnosus, varius; pileo ab initio conico, post campaniformi; petiolo cylindraceo, ad basin crassiori, plerumque curuato; velo, annulo, & nomine in *Bauaria* priuatus.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo campanulato.

Fig. II. Fungus explicatus; pileo conuexo.

Fig. III. Fungus explicatus; pileo conico.

Fig. IV. Fungus infundibulum aemulans; quoad faciem inferiorem.

Fig. V. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. VI. VII. Pollen natius & auctus.

Erklärung der zweyhundert acht und dreyßigsten Kupfertafel.

## Der hundert sechs und zwanzigste Blatterschwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger, einzelner, voller, wenig fleischiger, abänderlicher Schwamm; mit einem anfangs kegelligen, nachhero flockigen Hute; mit einem runden, unten dickern, meist gebogenen Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit glockigem Hute.

Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; mit gewölbtem Hute.

Fig. III. Ein entwickelter Schwamm; mit kegelligem Hute.

Fig. IV. Ein trichterähnlicher Schwamm; nach seiner Unterfläche.

Fig. V. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. VI. VII. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



AGARICVS CENTESIMVS VICESIMVS SEPTIMVS.

Est fungus lignarius, vni- vel bicolor, solitarius, farctus, non carnosus, varius; pileo ab initio globoso, post conico, denique conuexo, ad oram semper plicato; petiolo duro, tenui, recto vel curuato; nullo velo, nulloque annulo. Nomen *Bauaris* ignotum.

Fig. I. Fungi variae explicationis & figurae.

Fig. II. Fungi minores; pileis conicis.

Fig. III. Fungi explicati; pileis floriformibus.

Fig. IV. Fungus explicatus, pileo conuexo.

Fig. V. Fungus quoad faciem inferiorem.

Fig. VI. VII. Pollen natius & auctus.

Erklärung der zweyhundert neun und dreyßigsten Kupfertafel.

Der hundert sieben und zwanzigste Blätterchwamm.

Es ist solcher ein- oder zweyfärbiger, einzelner, voller, unfleischiger, abänderlicher Holzschwamm; mit einem anfangs kugelrunden, hernach kegelligen, endlich gewölbten, am Rande allezeit gefalteten Hute; mit einem harten, zarten, geraden oder gekrümmten Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Schwämme von verschiedener Entwicklung und Gestalt.

Fig. II. Schwämme mit kegelligen Hüten.

Fig. III. Entwickelte Schwämme, mit blumenähnlichen Hüten.

Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm; mit gewölbtem Hute.

Fig. V. Ein Schwamm, nach seiner Unterfläche.

Fig. VI. VII. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.





Fig. I.






Fig. I.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. IV.



Fig. IX.



Fig. VIII.





AGARICVS CENTESIMVS VICESIMVS  
OCTAVVS.

Est fungus bicolor, solitarius, farctus, carnosus, varius; pileo ab initio conico, post semicirculari seu plano, semper squamoso & striato; petiolo cylindraceo, ad radicem crassiori; velo, annulo, & nomine in *Bauaria* destitutus.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo semicirculari.

Fig. II—IV. Fungi explicari incipientes; pileis conicis.

Fig. V. Fungus explicatus, pileo planiusculo.

Fig. VI. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.

Fig. VII. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. VIII. IX. Pollen nativus & auctus.

Erklärung der zweyhundert und vierzigsten Kupfertafel.

Der hundert acht und zwanzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, einzelner, voller, fleischiger, abänderlicher Schwamm; mit einem anfangs kegelligen, nachhero halbrunden oder flachen, allezeit schuppigen und gestrichelten Hute; mit einem runden, unten dickern Stiele; ohne Ring und Saamendecke. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit halbrundem Hute.

Fig. II—IV. Schwämme, die sich zu entwickeln anfangen; mit kegelligen Hüten.

Fig. V. Ein entwickelter Schwamm; mit ziemlich flachem Hute.

Fig. VI. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche.

Fig. VII. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. VIII. IX. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



AGARICVS CENTESIMVS VICESIMVS  
NONVS.

Est fungus unicolor, solitarius, farctus, parum carnosus, parumque varius, volua spuria donatus; pileo ab initio globofo, post semicirculari; petiolo cylindraceo, ad basin crassiori; velo coriaceo, & annulo persistente praeditus. In *Bauaria* nomine gaudet nullo.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo semicirculari.

Fig. II. Idem fungus, quoad faciem inferiorem.

Fig. III. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. IV. Pollen natiuus.

Fig. V. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert ein und vierzigsten Kupfertafel.

Der hundert neun und zwanzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger, einzelner, voller, wenig fleischiger, und wenig abänderlicher, unächter Eyschwamm; mit einem anfangs kugelrunden, nachher halbrunden Hute; mit einem runden, unten dickern Stiele; mit einer häutigen Saamendecke, und beständigem Ringe. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit halbrundem Hute.

Fig. II. Eben derselbe Schwamm, nach seiner Unterfläche.

Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. IV. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. V. Der vergrößerte Saamenstaub.





Fig. I.



Fig. II.

Fig. V.




Fig. III.



Fig. IV.





Fig. IV.



Fig. VI.





Fig. VII.





AGARICVS CENTESIMVS TRICESIMVS.

Est fungus bicolor, solitarius, fistulosus, parum carnosus, varius; pileo ab initio globoso seu conico, post campaniformi, denique plano, semper squamoso; pileo cylindraceo, ad basin plerumque crassiori, recto vel curuato; velo coriaceo & annulo persistente donatus. *Bauaris* nomen est nullum.

- Fig. I. Fungus explicari incipiens; pileo conico.  
Fig. II. Fungus explicatus; pileo plano, ad oram fisso.  
Fig. III. Fungus explicatus; pileo campaniformi.  
Fig. IV. Fungus quoad faciem inferiorem; velo rupto.  
Fig. V. Fungus nondum explicatus, ad perpendiculum dissectus.  
Fig. VI. VII. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert zwey und vierzigsten Kupfertafel.

Der hundert und dreyßigste Blatterschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, einzelner, hohler, wenig fleischiger, abänderlicher Schwamm; mit einem kugelrunden, oder kegelligen, nachhero glockigen Hute; mit einem runden, unten meistentheils dickern, geraden oder krummgebogenen Stiele; mit einer häutigen Saamendecke und beständigem Ringe. Hat in Bayern keinen Namen.

- Fig. I. Ein sich entwickelter Schwamm; mit kegeligem Hute.  
Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; mit flachem, am Rande gespaltenem Hute.  
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm; mit glockigem Hute.  
Fig. IV. Ein Schwamm nach seiner Unterfläche, mit der zerrissenen Saamendecke.  
Fig. V. Ein sich entwickelnder Schwamm, senkrecht zerschnitten.  
Fig. VI. VII. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



AGARICVS CENTESIMVS TRICESIMVS  
PRIMVS.

Est fungus unicolor, & simplex & multiplex, farctus, vix carnosus, parum varius; pileo plerumque infundibuliformi, ad oram saepe reuoluto; petiolo cylindraceo, recto vel curuato, radicem versus tenuiori. Nec velum nec annulum, nec nomen in *Bauaria* habens.

- Fig. I. Fasciculus fungorum; pileis variae figurae.  
Fig. II. Fasciculus fungorum, multa aqua imbutorum, hinc colore variato.  
Fig. III. Fasciculus fungorum; pileis fere planis.  
Fig. IV. Fungus explicatus; pileo floriformi.  
Fig. V. Fungus explicatus; pileo reuoluto.  
Fig. VI. Fungus quoad faciem inferiorem.  
Fig. VII. Fungus ad perpendiculum dissectus.  
Fig. VIII. IX. Pollen natius & vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert drey und vierzigsten Kupfertafel.

Der hundert ein und dreyßigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger, theils einfacher, theils vielfacher, voller, wenig fleischiger und wenig abänderlicher Schwamm; mit einem meistens trichterigen, am Rande oft aufgerollten Hute; mit einem runden, geraden, oft krummgebogenen, und unten dünnern Stiele; ohne Saamendecke, ohne Ring, auch ohne Namen in Bayern.

- Fig. I. Ein Büschel Schwämme; mit Hüten von verschiedener Gestalt.  
Fig. II. Ein Büschel Schwämme, die viel Wasser angesauget, und dadurch die Farbe geändert haben.  
Fig. III. Ein Büschel Schwämme, mit etwas flachen Hüten.  
Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm, mit blumenähnlichem Hute.  
Fig. V. Ein entwickelter Schwamm, mit aufgerolltem Hute.  
Fig. VI. Ein Schwamm nach seiner Unterfläche.  
Fig. VII. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.  
Fig. VIII. IX. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



Fig. I.



Fig. III.



Fig. VI.



Fig. IV.



Fig. IX.



Fig. VIII.



Fig. V.



Fig.

II.




Fig. VII.



Loibl pice. et sa Rat.







AGARICVS CENTESIMVS TRICESIMVS  
SECVNDVS.

Est fungus bicolor, solitarius, fistulosus, parum carnosus, varius, volua praeditus; pileo ab initio ouali, post campaniformi; petiolo cylindraceo, recto vel curuato; velo, annulo & nomine in *Bauaria* nullo.

Varietas forsan fungi *sexagesimi sexti*. Tab. *LXXXV. LXXXVI.*

Fig. I. Fungus voluae adhuc inclusus.

Fig. II. Fungus e volua rupta adscendens.

Fig. III. Fungus voluae adhuc inclusus & ad perpendiculum dissectus.

Fig. IV. V. Fungus minor & major, pileis campaniformibus, ad oram striatis.

Fig. VI. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.

Fig. VII. VIII. Pollen natius & auctus.

Erklärung der zweyhundert vier und vierzigsten Kupfertafel.

Der hundert zwey und dreyßigste Blatterschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, einzelner, hohler, wenig fleischiger, abänderlicher Enschwamm; mit einem anfangs länglich runden, nachher glockigen Hute; mit einem rundlichen, geraden, oder krummgebo- genen Stiele; ohne Saamendecke, Ring und Namen in Bayern. Vielleicht eine Abänderung des sechs und sechzigsten Schwammes. Tab. *LXXXV. LXXXVI.*

Fig. I. Ein noch in seinem Eye verschlossener Schwamm.

Fig. II. Ein aus seinem Eye ausbrechender Schwamm.

Fig. III. Ein in dem Eye noch verschlossener Schwamm, senkrecht zerschnitten.

Fig. IV. V. Ein kleiner und grosser Schwamm; mit glockigem, am Rande gestrichel- tem Hute.

Fig. VI. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche.

Fig. VII. VIII. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE QVADRAGESIMAE QVINTAE.

AGARICVS CENTESIMVS TRICESIMVS  
TERTIVS.

Est fungus bi- vel tricolor, solitarius, fistulosus, parum car-  
nosus, varius, volua donatus; pileo ab initio ovali,  
post conico, denique campaniformi; petiolo cylindra-  
ceo, radicem versus crassiori; velo & annulo carens.  
*Bauaris* nomen nullum.

Fig. I. Fungus e volua adscendens.

Fig. II. Fungus e volua egressus.

Fig. III. Fungus explicatus; pileo campaniformi.

Fig. IV. Fungus explicari incipiens; pileo conico.

Fig. V. Fungus, quoad faciem inferiorem.

Fig. VI. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. VII. VIII. Pollen nativus & auctus.

Erklärung der zweyhundert fünf und vierzigsten Kupfertafel.

Der hundert drey und dreyßigste Blatterschwamm.

Es ist solcher ein zwey- oder dreyfärbiger, einzelner, hohler, wenig fleischi-  
ger, abänderlicher Eyschwamm; mit einem anfänglich länglichrun-  
den, hernach kegelligen, endlich glockigen Hute; mit einen runden,  
nach unten zu dickern Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat  
in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein Schwamm, wie er aus dem Eye durchbricht.

Fig. II. Ein aus dem Eye aufsteigender Schwamm.

Fig. III. Ein entwickelter Schwamm; mit glockigem Hute.

Fig. IV. Ein sich entwickelnder Schwamm; mit kegeligem Hute.

Fig. V. Ein Schwamm nach seiner Unterfläche.

Fig. VI. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. VII. VIII. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. V.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. VI.



Fig.

III.



Fig. IV.



St. L. p. R.

I. G. F. sc. R.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. IX.



Fig. X.



Fig. XII.



Fig. VIII.



Fig. XI.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. IV.



Fig. VII.



Fig. VI.



St. I. p. R.

I. G. F. sc. R.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE QVADRAGESIMAE SEXTAE,

AGARICVS CENTESIMVS TRICESIMVS  
QVARTVS.

Est fungus lignarius, plerumque bicolor, & simplex & multiplex, sessilis, subtremulans, non modo figura, sed & per aetatem colore adeo varius, vt certi quid determinari nequeat.

Fig. I — VIII. Varietates huius fungi.

Fig. IX. Fungus quoad faciem inferiorem.

Fig. X. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. XI. Pollen natiuus.

Fig. XII. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert sechs und vierzigsten Kupfertafel.

Der hundert vier und drenßigste Blatterschwamm.

Es ist ein insgemein zweyfärbiger, sowohl einzelner als vielfacher, etwas zitternder Holzschwamm, ohne Stiel; und der Gestalt sowohl, als der Farbe nach, so abänderlicher und verschiedener Schwamm, daß sich etwas gewisses und beständiges nicht angeben läßt.

Fig. I. — VIII. Abänderungen dieses Schwammes.

Fig. IX. Ein Schwamm nach seiner Unterfläche.

Fig. X. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. XI. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. XII. Der vergrößerte Saamenstaub.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE QVADRAGESIMAE SEPTIMAE.

AGARICVS CENTESIMVS TRICESIMVS  
QVINTVS.

Est fungus bicolor, solitarius, farctus, vix carnosus, varius; pileo ab initio conico, post campaniformi, in centro fastigiato, semper piloso; petiolo cylindraceo, recto vel curuo, radicem versus crassiori; velo coriaceo & annulo persistente praeditus. In *Bauaria* nomen habet nullum.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo campaniformi.

Fig. II. Fungus quoad faciem inferiorem.

Fig. III. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. IV. Pollen natiuus.

Fig. V. Pollen lente auctus.

Erklärung der zweyhundert sieben und vierzigsten Kupfertafel.

Der hundert fünf und dreyßigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, einzelner, voller, fast gar nicht fleischiger, abänderlicher Schwamm; mit einem anfangs kegelligen, nachhero glockigen, in der Mitten erhöhten, allezeit haarigen Hute; mit rundem, geradem, oder gekrümmtem, und noch unten zu dickerem Stiele; mit einer lederhaften Saamendecke und beständigen Ringe. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit glockigem Hute.

Fig. II. Ein Schwamm nach seiner Unterfläche.

Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. IV. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. V. Der vergrößerte Saamenstaub.









Fig. III.

Fig. IV.

Fig. I.

Fig. II.

St. L. p. R.

I. G. F. sc. R.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE QVADRAGESIMAE OCTAVAE.

AGARICVS CENTESIMVS TRICESIMVS  
SEXTVS.

Est fungus vnicolor, & lignarius, & lignosus, & simplex,  
& multiplex, farctus, varius; pileo, ob impedimenta  
loci, vbi nascitur, incerto, & fere semper alio; petiolo  
cylindraceo, longo, plerumque varie curuato; nec  
velum, nec annulum, nec nomen in *Bauaria*, habens.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo infundibuliformi.

Fig. II. Idem fungus, quoad faciem posteriorem.

Fig. III. Pollen natiuus.

Fig. IV. Pollen auctus.

Erklärung der zweyhundert acht und vierzigsten Kupfertafel.

Der hundert sechs und dreyßigste Blatterschwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger, holziger, theils einzelner, theils vielfacher,  
voller, abänderlicher Holzschwamm; mit einem, nach den vorge-  
fundenen Hindernissen des Ortes, wo er sich entwickelt, unbestim-  
ten und fast allezeit andern Hute; mit einem runden, langen, meist  
mannigfaltig gekrümmten Stiele; ohne Saamendecke, Ring und  
Namen in Bayern.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit trichterigem Hute.

Fig. II. Eben derselbe Schwamm; nach seiner hintern Fläche.

Fig. III. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. IV. Der vergrößerte Saamenstaub.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE QVADRAGESIMAE NONAE.

AGARICVS CENTESIMVS TRICESIMVS  
SEPTIMVS.

Etsi nullus dubito, quin hic fungus antecedentis fungi sit  
varietas, eum tamen, ob singularem evolutionis for-  
mam, pictum exhibere non abs re duxi.

Fig. I. Trias fungorum, quorum tertius pileo priuatus.

Fig. II. Pollen natiuus.

Fig. III. Pollen auctus.

Erklärung der zweyhundert neun und vierzigsten Kupfertafel.

Der hundert sieben und dreyßigste Blatterschwamm.

Ob ich gleich selbst überzeuget bin, daß der gegenwärtige Schwamm blos  
eine Abänderung des vorhergehenden sey; so habe ich solchen doch,  
wegen seiner sonderbaren Entwicklung und Gestalt, nicht weglassen  
wollen.

Fig. I. Drey Schwämme, davon der eine ohne Hut ist.

Fig. II. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. III. Der vergrößerte Saamenstaub.





Fig. I.

Fig. II.

Fig. III.

St. L. p. R.

I. G. F. sc. R.





Fig. I.



Fig. IV.




Fig. V.



Fig. II.



Fig. III.

St. L. p. R.

I. G. F. sc. R.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE QVINQVAGESIMAE.

AGARICVS CENTESIMVS TRICESIMVS  
OCTAVVS.

Est fungus bi- vel tricolor, solitarius, farctus, vix carnosus, parum varius; pileo, conico, striato; petiolo cylindraceo, radicem versus crassiori; nec velum, nec annulum, nec nomen in *Bauaria*, habens.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo conico.

Fig. II. Idem fungus quoad faciem inferiorem.

Fig. III. Idem fungus, ad perpendiculum dissectus.

Fig. IV. Pollen natiuus.

Fig. V. Pollen auctus.

Erklärung der zweyhundert und funfzigsten Kupfertafel.

Der hundert acht und dreyßigste Blatterschwamm.

Es ist solcher ein zwey- oder dreyfärbiger, einzelner, voller, fast gar nicht fleischiger, wenig abänderlicher Schwamm; mit einem kegelligen, gestreiften Hute; mit einem runden, unten dickern, Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit kegeligem Hute.

Fig. II. Eben derselbe Schwamm; nach seiner Unterfläche.

Fig. III. Eben derselbe Schwamm, senkrecht zerschnitten.

Fig. IV. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. V. Der vergrößerte Saamenstaub.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE QVINQVAGESIMAE PRIMAE.

AGARICVS CENTESIMVS TRICESIMVS  
NONVS.

Est fungus bi- vel tricolor, solitarius, farctus, carnosus, varius; pileo ab initio globofo, vel conico, apice faepe quasi truncato, post hemisphaerico; petiolo crasso, ad radicem bulbofo; nec velum, nec annulum, nec nomen in *Bauaria*, habens.

Fig. I. Fungus nondum explicatus; pileo fere conico, apice quasi truncato.

Fig. II. Fungus explicatus; pileo hemisphaerico.

Fig. III. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. IV. Pollen natiuus.

Fig. V. Pollen auctus.

Erklärung der zweyhundert ein und funfzigsten Kupfertafel.

Der hundert neun und dreyßigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein zwey- oft dreyfärbiger, einzelner, voller, fleischiger, abänderlicher Schwamm; mit einem anfangs kugelrunden oder kegelligen, oben gleichsam abgestuften, nachhero halbrunden Hute; mit einem dicken, unten knolligen Stiele; ohne Saamendecke, Ring und Namen in Bayern.

Fig. I. Ein noch nicht entwickelter Schwamm; mit einem fast kegelligen, und oben abgestuften Hute.

Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; mit halbkugelumdem Hute.

Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. IV. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. V. Der vergrößerte Saamenstaub.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.







Fig. I.



Fig. II.




Fig. III.



Fig. V.

Fig. IV.





EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE QVINQVAGESIMAE SECVNDAE.

## AGARICVS CENTESIMVS QVADRAGESIMVS.

Est fungus, ob locum natalem lignarius, vni- vel bicolor, solitarius, farctus, vix carnosus, parum varius; pileo fere semper infundibuliformi; petiolo cylindraceo, breui; velo, annulo, & nomine in *Bauaria*, privatus.

Fig. I. Fungus explicatus; ligno insidens.

Fig. II. Fungus explicatus; quoad faciem inferiorem, & cuius petiolo minor adnatus.

Fig. III. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. IV. Pollen natiuus.

Fig. V. Pollen auctus.

Erklärung der zweyhundert zwey und funfzigsten Kupfertafel.

## Der hundert und vierzigste Blatterschwamm.

Es ist ein einz oder zweyfärbiger, einzelner, voller, kaum fleischiger, wenig veränderlicher Holzschwamm; mit einem fast allezeit trichterigen Hute; mit einem runden und kurzen Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; wie er dem Holze aufsetzet.

Fig. II. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche; und dessen Stiele ein anderer kleiner angewachsen ist.

Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. IV. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. V. Der vergrößerte Saamenstaub.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE QVINQVAGESIMAE TERTIAE.

AGARICVS CENTESIMVS QVADRAGESIMVS PRIMVS.

Est fungus, ob locum natalem, lignarius, bicolor, solitarius, farctus, carne destitutus, parum varius; pileo fere semper conico; petiolo cylindraceo, ad radicem crassiori; nullo velo, annulo & nomine in *Bauaria*.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo conico; ligno insidens.

Fig. II. Fungus quoad faciem inferiorem.

Fig. III. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. IV. Pollen nativus.

Fig. V. Pollen auctus.

Erklärung der zweyhundert drey und funfzigsten Kupfertafel.

Der hundert ein und vierzigste Blatterschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, einzelner, voller, unfleischiger, wenig abänderlicher Holzschwamm; mit einem fast allezeit kegelligen Hute; mit einem runden, unten dickern Stiele; ohne Saamendecke, ohne Ring, auch ohne Namen in *Bayern*.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit kegeligem und wie er dem Holze aufsitzt.

Fig. II. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche.

Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. IV. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. V. Der vergrößerte Saamenstaub.



Fig. V.



Fig. IV.




Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



St. L. p. R.

I. G. F. sc. R.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.




Fig. V.





EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE QVINQVAGESIMAE QVARTAE.

AGARICVS CENTESIMVS QVADRAGESIMVS SECVNDVS.

Est fungus tricolor, solitarius, farctus, non carnosus, varius; pileo ab initio globofo, post hemisphaerico, denique plano; petiolo cylindraceo, ad radicem tenuiori; velum, annulus, & nomen in *Bauaria*, desideratur.

- Fig. I. Fungus explicatus; pileo plano.  
Fig. II. Fungus, quoad faciem inferiorem.  
Fig. III. Fungus ad perpendicularum dissectus.  
Fig. IV. Pollen natiuus.  
Fig. V. Pollen auctus.

Erklärung der zweyhundert vier und funfzigsten Kupfertafel.

Der hundert zwey und vierzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein dreyfärbiger, einzelner, voller, unfleischiger, abänderlicher Schwamm; mit anfangs kugelrundem, nachhero halbrundem, endlich flachem Hüte; mit einem runden, nach unten zu dünneren Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

- Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit flachem Hüte.  
Fig. II. Ein Schwamm, nach seiner Unterfläche.  
Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.  
Fig. IV. Der natürliche Saamenstaub.  
Fig. V. Der vergrößerte Saamenstaub.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE QVINQVAGESIMAE QVINTAE.

AGARICVS CENTESIMVS QVADRAGESIMVS TERTIVS.

Est fungus bicolor, & simplex & multiplex, cauus, non carnosus, varius; pileo ab initio globoso, post hemisphaerico, denique plano, plicato, acuminato, in centro depresso; petiolo cylindraceo, recto vel curuato; velo, annulo, & nomine in *Bauaria*, carens.

Fig. I. Fasciculus fungorum; variae explicationis & figurae.

Fig. II. Fungus quoad faciem inferiorem.

Fig. III. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. IV. Pollen natiuus.

Fig. V. Pollea vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert fünf und funfzigsten Kupfertafel.

Der hundert drey und vierzigste Blatterschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, theils einfacher, theils vielfacher, hohler, unfleischiger, abänderlicher Schwamm; mit einem anfangs kugelförmigen, nachher halbrunden, endlich flachen, gefalteten, zugespitzten, in der Mitten vertieften Hute; mit einem runden, geraden oder gekrümmten Stiele; ohne Saamendecke, ohne Ring, auch ohne Namen in Bayern.

Fig. I. Ein Büschel Schwämme, von verschiedener Entwicklung und Gestalt.

Fig. II. Ein Schwamm, nach seiner Unterfläche.

Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. IV. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. V. Der vergrößerte Saamenstaub.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. III.

Fig. V.





Fig. I.



Fig. IV.



Fig. V.




Fig. II.



Fig. III.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE QVINQVAGESIMAE SEXTAE.

AGARICVS CENTESIMVS QVADRAGESIMVS QVARTVS.

Est fungus unicolor, fere bicolor, solitarius, farctus, carnosus, parum varius; pileo ab initio globoso, post hemisphaerico, tandem plano; petiolo cylindraceo, radicem versus crassiori; velo, annulo, & nomine in *Bauaria*, carens.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo hemisphaerico.

Fig. II. Fungus explicatus; quoad faciem inferiorem.

Fig. III. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. IV. Pollen natiuus.

Fig. V. Pollen lente auctus.

Erklärung der zweyhundert sechs und funfzigsten Kupfertafel.

Der hundert vier und vierzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein einz oder zweyfärbiger, einzelner, voller, fleischiger, wenig abänderlicher Schwamm; mit einem kugelrunden, nachhero halbrunden, endlich flachen Hute; mit einem runden, nach unten zu dickern Stiele; ohne Saamendecke, ohne Ring, auch ohne Namen in *Bayern*.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit halbrundem Hute.

Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; nach seiner Unterfläche.

Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. IV. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. V. Der vergrößerte Saamenstaub.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE QVINQVAGESIMAE SEPTIMAE.

AGARICVS CENTESIMVS QVADRAGESIMVS QVINTVS.

Est fungus unicolor, & simplex, & multiplex, farctus, carne destitutus, parum varius; pileo conico, post planiusculo, in centro acuminato, integro vel fisso; petiolo cylindraceo, radicem versus crassiori, saepe radicibus donato. Velo, annulo, & nomine in *Bauaria*, carens.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo in centro acuminato.

Fig. II. Fungus quoad faciem inferiorem.

Fig. III. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. IV. Fasciculus fungorum; pileis ad oram fissis.

Fig. V. VI. Pollen nativus & auctus.

Erklärung der zweyhundert sieben und funfzigsten Kupfertafel.

Der hundert fünf und vierzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger, so wohl einzelner, als vielfacher, voller, unfleischiger, wenig abänderlicher Schwamm; mit einem kegelligen, nachhero etwas flachen, in der Mitten erhöhten, ganzen oder gespaltnen Hute; mit einem runden, nach unten zu dickern, oft bewurzeltem, Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit einem in der Mitten erhöhtem Hute.

Fig. II. Ein Schwamm, nach seiner Unterfläche.

Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. IV. Ein Büschel Schwämme; deren Hüte am Rande gespalten sind.

Fig. V. VI. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



Fig. I.



Fig. II.




Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. V.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. VII.



Fig. III.



Fig. VI.



Fig. IV.



Fig. V.



St. L. p. R.

I. G. F. sc. R.

*Handwritten text:* F. T. p. 12

*Handwritten text:* 1792  
1793  
1794  
1795  
1796  
1797  
1798  
1799  
1800  
1801  
1802  
1803  
1804  
1805  
1806  
1807  
1808  
1809  
1810  
1811  
1812  
1813  
1814  
1815  
1816  
1817  
1818  
1819  
1820  
1821  
1822  
1823  
1824  
1825  
1826  
1827  
1828  
1829  
1830  
1831  
1832  
1833  
1834  
1835  
1836  
1837  
1838  
1839  
1840  
1841  
1842  
1843  
1844  
1845  
1846  
1847  
1848  
1849  
1850  
1851  
1852  
1853  
1854  
1855  
1856  
1857  
1858  
1859  
1860  
1861  
1862  
1863  
1864  
1865  
1866  
1867  
1868  
1869  
1870  
1871  
1872  
1873  
1874  
1875  
1876  
1877  
1878  
1879  
1880  
1881  
1882  
1883  
1884  
1885  
1886  
1887  
1888  
1889  
1890  
1891  
1892  
1893  
1894  
1895  
1896  
1897  
1898  
1899  
1900



AGARICVS CENTESIMVS QVADRAGE-  
SIMVS SEXTVS.

Est fungus fere unicolor, solitarius, farctus, paullulum car-  
nosus, parum varius, volua spuria saepe donatus; pileo  
ab initio conico vel globoso, post hemisphaerico; pe-  
tiolo crasso, cylindraceo, ad radicem bulbofo, vel  
volua spuria praedito; velum coriaceum & annulum  
persistentem habens. Nomen in *Bauaria* deest.

- Fig. I. Fungus nondum explicatus; pileo conico.  
Fig. II. Fungus explicatus annulo & volua spuria donatus.  
Fig. III. Fungus explicari incipiens, quoad faciem inferiorem.  
Fig. IV. Fungus explicatus, annulo persistente.  
Fig. V. Fungus ad perpendiculum dissectus.  
Fig. VI. VII. Pollen nativus & auctus.

Erklärung der zweyhundert acht und funfzigsten Kupfertafel.

Der hundert sechs und vierzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger, einzelner, voller, etwas fleischiger, wenig  
abänderlicher, unächter Enschwamm; mit einem anfangs kegelligen  
oder kugelrunden, nachhero halbrunden Hute; mit einem starken,  
runden, unten knolligen, oder Asterene versehenen, Stiele; mit einer  
häutigen Saamendecke und beständigen Ringe. Hat in Bayern  
keinen Namen.

- Fig. I. Ein noch unentwickelter Schwamm; mit kegeligem Hute.  
Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; mit dem Ringe und Asterene.  
Fig. III. Ein sich entwickelnder Schwamm, nach seiner Unterfläche.  
Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm; mit dem beständigen Ringe.  
Fig. V. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.  
Fig. VI. VII. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



AGARICVS CENTESIMVS QVADRAGESIMVS SEPTIMVS.

Est fungus bicolor, plerumque multiplex, farctus, carnosus, parum varius; pileo semper conico & in centro acuminato; petiolo crasso, apicem & radicem versus tenuiori; velo, annulo, & nomine in *Bauaria*, destitutus.

Fig. I. Fasciculus fungorum; pileis hinc inde connatis.

Fig. II. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. III. Fungus quoad faciem inferiorem.

Fig. IV. Pollen natiuus.

Fig. V. Pollen auctus.

Erklärung der zweyhundert neun und funfzigsten Kupfertafel.

Der hundert sieben und vierzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, meistens vielfacher, voller, fleischiger, wenig abänderlicher Schwamm; mit einem allezeit kegelligen und in der Mitten zugespizten Hute; mit einem dicken, nach oben und unten zu dünnern Stiele; ohne Saamendecke, ohne Ring, auch ohne Namen in Bayern.

Fig. I. Ein Büschel Schwämme; mit zusammengewachsenen Hüten.

Fig. II. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. III. Ein Schwamm nach seiner Unterfläche.

Fig. IV. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. V. Der vergrößerte Saamenstaub.



Fig. I.



Fig. V.



Fig. IV.



Fig. II.



Fig. III.





Fig. II.



Fig. I.

Fig. III.



Fig. IV.





EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE SEXAGESIMAE.

AGARICVS CENTESIMVS QVADRAGE-  
SIMVS OCTAVVS.

Est fungus singularis; cuius pileo par fungorum inuer-  
forum quasi insident. Num varietas fungi septua-  
gesimi septimi? *Tab. LXXXVII. LXXXVIII.*

Fig. I. Fungus figurae naturalis.

Fig. II. Fungus ad perpendicularum dissectus.

Fig. III. Pollen natiuus.

Fig. IV. Pollen auctus.

Erklärung der zweyhundert und sechzigsten Kupfertafel.

Der hundert acht und vierzigste Blatterschwamm.

Es ist ein sonderbarer und ausserordentlicher Schwamm; auf dessen  
Hute ein paar Schwämme verkehrt aufgewachsen zu seyn scheinen.  
Vielleicht eine Abänderung des sieben und siebenzigsten Schwammes?  
*Tab. LXXXVII. LXXXVIII.*

Fig. I. Ein Schwamm, nach seiner natürlichen Bildung.

Fig. II. Eben derselbe Schwamm, senkrecht zerschnitten.

Fig. III. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. IV. Der vergrößerte Saamenstaub.



AGARICVS CENTESIMVS QVADRAGESIMVS NONVS.

Est fungus volua spuria donatus, bicolor, solitarius, farctus, parum carnosus, varius; pileo ab initio globoso, post hemisphaerico, denique plano; petiolo crasso, tuberoso; velo coriaceo & annulo persistente praeditus. In *Bauaria* nominatur *wilder Fliegenschwamm*.

Fig. I. Fungus nondum explicatus; pileo globoso.

Fig. II. Fungus nondum explicatus; quoad faciem inferiorem, velo adhuc integro.

Fig. III. Fungus explicatus; pileo hemisphaerico, varie maculato.

Fig. IV. Fungus ad perpendicularum dissectus.

Fig. V. VI. Pollen nativus & auctus,

Erklärung der zweyhundert ein und sechzigsten Kupfertafel.

Der hundert neun und vierzigste Blatterschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, einzelner, voller, wenig fleischiger, abänderlicher, unächter Eyschwamm; mit einem anfangs kugelrunden, nachhero halbrunden, endlich flachen Hute; mit einem dicken, knolligen Stiele; mit einer häutigen Saamendecke und beständigem Ringe. In *Bayern* heißt er *wilder Fliegenschwamm*.

Fig. I. Ein noch unentwickelter Schwamm; mit kugelrundem Hute.

Fig. II. Ein noch unentwickelter Schwamm; nach seiner Unterfläche und der noch ganzen Saamendecke.

Fig. III. Ein entwickelter Schwamm; mit halbrundem und geflecktem Hute.

Fig. IV. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. V. VI. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.





Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.




Fig. V.




Fig. IV.

Fig. VI.









BOLETI.

Söcher schwämme.



BOLETVS VICESIMVS SEPTIMVS.

Est fungus tubulosus, multicolor, sessilis, durus, & lignarius & lignosus, persistens, varius; pileo fere semper alio. In *Bauaria* nomen habet nullum.

Fig. I. Fungus semicircularis.

Fig. II. Idem fungus, quoad faciem inferiorem.

Fig. III. Fungus pedem equinum referens.

Fig. IV. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. V. VI. Pollen nativus & auctus.

Erklärung der zweyhundert zwey und sechzigsten Kupfertafel.

Der sieben und zwanzigste Bilz.

Es ist solcher ein röhriger, vielfarbiger, stielloser, harter und holziger, dauerhafter, abänderlicher Holzschwamm; mit einem fast allezeit anderen Hute. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein halbkreisrunder Schwamm.

Fig. II. Eben derselbe Schwamm, nach seiner Unterfläche.

Fig. III. Ein pferdhufiger Schwamm.

Fig. IV. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. V. VI. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



Fig. I.



Fig. VI.



Fig. V.



Fig. III.



Fig. II.




Fig. IV.






Fig. I.



Fig. V.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.





BOLETVS VICESIMVS OCTAVVS.

Est fungus tubulosus, bi- vel tricolor, & sessilis & petiolatus, durus, & lignarius & lignosus, persistens, varius; pileo plerumque semicirculari, non raro deformi. In *Bauaria* nomen habet nullum. *Num varietas boleti vicesimi quinti? Tab. CXXXIII.*

Fig. I. Fungus semicircularis; petiolo donatus.

Fig. II. Fungus sessilis.

Fig. III. Fungus quoad faciem inferiorem.

Fig. IV. Pollen natiuus.

Fig. V. Pollen auctus.

Erklärung der zweyhundert drey und sechzigsten Kupfertafel.

Der acht und zwanzigste Bilz.

Es ist solcher ein röhriger, zwey- oder dreyfärbiger, sowohl bestielter, als auch stielloser, harter, holziger, dauerhafter, abänderlicher Holzschwamm; mit einem meistens halbcirkelrunden, jedoch auch sehr oft ungestalteten Hute. Hat in *Bayern* keinen Namen. Vielleicht eine Abänderung des fünf und zwanzigsten Bilzes? *Tab. CXXXIII.*

Fig. I. Ein halbcirkelrunder bestielter Schwamm.

Fig. II. Ein stielloser Schwamm.

Fig. III. Ein Schwamm, nach seiner Unterfläche.

Fig. IV. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. V. Der vergrößerte Saamenstaub.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE SEXAGESIMAE QVARTAE.

## BOLETVS VICESIMVS NONVS.

Est fungus tubulosus, bicolor, singularis, deformis, durus, lignosus, persistens; pileo & petiolo donatus.

Fig. I. Fungus, quoad faciem superiorem & inferiorem.

Fig. II. Particula fungi ad perpendiculum dissecti.

Fig. III. Pollen nativus.

Fig. IV. Pollen auctus.

Erklärung der zweyhundert vier und sechzigsten Kupfertafel.

## Der neun und zwanzigste Bilz.

Es ist solcher ein röhriger, zweyfärbiger, einzelner, ungestalteter, harter, holziger, dauerhafter Schwamm; mit einem Hute und Stiele.

Fig. I. Der Schwamm nach seiner obern und untern Fläche.

Fig. II. Ein Stückgen dieses Schwammes, senkrecht abgeschnitten.

Fig. III. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. IV. Der vergrößerte Saamenstaub.



Fig. I.




Fig. II.



Fig. III.




Fig. IV.



Fig. I.





EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE SEXAGESIMAE QVINTAE.

BOLETVS TRICESIMVS.

Est fungus tubulosus, esculentus, bicolor, ramosus, farctus, carnosus, arborius, parum varius; pileis ab initio globosis, post hemisphaericis; petiolis varie flexis & tortuosis. In *Bauaria* dicitur *Eichhaase*.

Fig. I. Fungus, quoad faciem anteriorem.

Erklärung der zweyhundert fünf und sechzigsten Kupfertafel.

Der dreyßigste Bilz.

Es ist solcher ein röhriger, eßbarer, zweyfärbiger, aestiger, voller, fleischiger, wenig abänderlicher Baumschwamm; mit anfangs kugelförmig, nachher halbrundem Hute; mit verschieden gebogenem und gerundetem Stiele. Heisset in Bayern *Eichhaase*.

Fig. I. Der Schwamm, wie er sich auf der vordern Seite zeigt.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE SEXAGESIMAE SEXTAE.

BOLETVS ANTECEDENS TRICESIMVS.

Vt de structura boleti antecedentis eo magis iudicari queat, haec tabula eum parte inferiori seu posteriori exhibet.

Fig. I. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem seu posteriorem.

Fig. II. Ramulus huius fungi ad perpendicularum dissecti.

Fig. III. Pollen nativus.

Fig. IV. Pollen auctus.

Erklärung der zweyhundert sechs und sechzigsten Kupfertafel.

Der vorhergehende dreßzigste Bilz.

Damit der Bau dieses Bilzes um so kenntlicher seyn möge; so habe ich solchen auf dieser Tafel noch einmal abbilden lassen.

Fig. I. Der entwickelte Schwamm, nach seiner Unterfläche und nach der Hinterseite.

Fig. II. Ein senkrecht abgeschnittener Ast dieses Schwammes.

Fig. III. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. IV. Der vergrößerte Saamenstaub.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. III.

St. I. p. R.

I. G. F. sc. R.



Fig. I.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. II.





EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE SEXAGESIMAE SEPTIMAE.

BOLETVS TRICESIMVS PRIMVS.

Est fungus tubulosus, bi- vel tricolor, plerumque multiplex, durus, floriformis; petiolo plano, ad oram varie exciso & formato; petiolo inverse conico. In *Bauaria* nomen habet nullum.

Fig. I. Fasciculus fungorum; & pileo & petiolo connatorum.

Fig. II. Fasciculus fungorum, quoad faciem inferiorem.

Fig. III. Pollen natiuus.

Fig. IV. Pollen lente auctus.

Erklärung der zweyhundert sieben und sechzigsten Kupfertafel.

Der ein und dreyßigste Pilz.

Es ist ein röhriger, zwey- oder dreyfärbiger, meistens vielfacher, harter, blumenähnlicher Schwamm; mit flachem, am Rande mannigfaltig aus- und eingeschnittenem Hute; mit einem umgekehrt kegelförmigen Stiele. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein Büschel Schwämme, mit den Hüten und Stielen zusammen gewachsen.

Fig. II. Ein Büschel Schwämme, nach der Unterfläche.

Fig. III. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. IV. Der vergrößerte Saamenstaub.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE SEXAGESIMAE OCTAVAE.

BOLETVS TRICESIMVS SECVNDVS.

Est fungus tubulosus, bicolor, lignarius, & simplex & multiplex, membranaceus, sessilis, foliaceus & floriformis. A *Bavaris* nullo nomine insignitur.

Fig. I. Fungi, & multiplices & simplices, ligno insidentes.

Fig. II. Fungus, quoad faciem inferiorem.

Fig. III. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. IV. V. Pollen nativus & auctus.

Erklärung der zweyhundert acht und sechzigsten Kupfertafel.

Der zwey und dreyßigste Bilz.

Es ist solcher ein röhriger, zweyfärbiger, sowohl einzelner, als vielfacher, häutiger, stielloser, blätteriger und blumenähnlicher Schwamm. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Einzelne und vielfache Schwämme; wie sie aus dem Holze gewachsen sind.

Fig. II. Ein Schwamm nach seiner Unterfläche.

Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. IV. V. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



Fig. I.



Fig. II.




Fig. IV.



Fig. III.



Fig. V.





Fig. I.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.





EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE SEXAGESIMAE NONAE.

BOLETVS TRICESIMVS TERTIVS.

Est fungus tubulosus, sessilis, lignarius, membranaceus, persistens; pileo plerumque semicirculari, lineolis concentricis a centro ad oram radiatis picto. In *Bauaria* nomen est nullum.

Fig. I. II. Fungi variae figurae, ligno insidentes.

Fig. III. Fungus, quoad faciem inferiorem.

Fig. IV. Particula fungi dissecti.

Fig. V. VI. Pollen nativus & auctus.

Erklärung der zweyhundert neun und sechzigsten Kupfertafel.

Der drey und dreyßigste Bilz.

Es ist solcher ein röhriger, stielloser, holziger, häutiger, dauerhafter Schwamm; mit meistentheils halbfugelrundem, und in der Mitten gegen dem Rande zu gestrahltem, zirkelinigem Hute. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. II. Schwämme von verschiedener Gestalt, wie sie dem Holze ansetzen.

Fig. III. Ein Schwamm nach seiner Unterfläche.

Fig. IV. Ein Stückgen Schwamm, senkrecht abgeschnitten.

Fig. V. VI. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE SEPTVAGESIMAE.

**BOLETVS TRICESIMVS QVARTVS.**

Est fungus tubulosus, bicolor, durus; & lignarius & ligno-  
sus, sessilis; pileo semicirculari, vndoso. Forſan va-  
rietas boleti vicesimi sexti? *Tab. CXXXVII.*  
*CXXXVIII.*

Fig. I. Fungus quoad faciem superiorem.

Fig. II. Fungus quoad faciem inferiorem.

Fig. III. Pollen nativus.

Fig. IV. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert und siebenzigsten Kupfertafel.

**Der vier und drenzigste Pilz.**

Es ist solcher ein röhriger, zweyfärbiger, harter, holziger, stielloser  
Holzschwamm; mit einem halbcirkelrunden, gewässerten Hute.  
Vieleicht eine Abänderung des sechs und zwanzigsten Pilzes?  
*Tab. CXXXVII. CXXXIII.*

Fig. I. Der Schwamm nach seiner Oberfläche.

Fig. II. Der Schwamm nach seiner Unterfläche.

Fig. III. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. IV. Der vergrößerte Saamenstaub.



Fig. I.



Fig. II.




Fig. IV.



Fig. III.









H Y D N A.

Stachelschwämme.



HYDNVM NONVM.

Est fungus unicolor, plerumque solitarius, farctus, carnosus, duriusculus, varius; pileo plano, integro vel varie exciso, & inciso, ad oram radiato; petiolo breui, inuerse conico, infra rotundato vel truncato. In *Bauaria* nomen habet nullum.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo plano, varie inciso & exciso, ad oram radiato & reuoluto.

Fig. II. Fungus quoad faciem inferiorem.

Fig. III. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. IV. Pollen natiuus.

Fig. V. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert ein und siebenzigsten Kupfertafel.

Der neunte Stachelschwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger, meistentheils einzelner, fleischiger, abänderlicher Schwamm; mit flachem, ganzen und mannigfaltig aus- und eingeschnittenem, am Rande gestrahltem Hute; mit einem kurzen, umgekehrt kegelligen, unten gerundeten und abgestuften Stiele. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit flachem, mannigfaltig ein- und ausgeschnittenem, am Rande gestrahltem und aufgerolltem Hute.

Fig. II. Ein Schwamm nach seiner Unterfläche.

Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. IV. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. V. Der vergrößerte Saamenstaub.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. V.



St. L. p. R.

Fig. IV.



I. G. F. sc. R.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.




Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. V.





HYDNVM DECIMVM.

Est fungus bicolor, plerumque solitarius, farctus, membranaceus, varius; pileo plano, ad oram fimbriato, exciso, saepe floriformi; petiolo cylindraceo, radicem versus tenuiori. *Bauari* nomen nesciunt.

Fig. I. Par fungorum, quorum minor quasi dipetalus, maior quoad faciem inferiorem.

Fig. II. Par fungorum connatorum.

Fig. III. Fungus quasi floriformis, monopetalus.

Fig. IV. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. V. VI. Pollen natius & auctus.

Erklärung der zweyhundert zwey und siebenzigsten Kupfertafel.

Der zehende Stachelschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, meistens einzeln, voller, häutiger, abänderlicher Schwamm; mit flachem, am Rande bekränzt und ausgeschnittenem, blumenartigem Hute; mit einem runden, nach unten zu dünnern, Stiele. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein paar Schwämme, davon der kleinere zweyblättrig, der grössere aber nach seiner Unterfläche sich zeigt.

Fig. II. Ein paar zusammengewachsene Schwämme.

Fig. III. Ein gleichsam einblättriger, blumenartiger Schwamm.

Fig. IV. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. V. VI. Der natürliche und vergrösserte Saamenstaub.



HYDNVM VNDECIMVM.

Est fungus uni- seu bicolor, solitarius, farctus, carnosus, parum varius; pileo conuexo, squamoso; petiolo inverse conico. Nomine in *Bauaria* gaudet nullo.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo conuexo, squamoso, quasi reniformi, in centro depresso.

Fig. II. Fungus, quoad faciem inferiorem.

Fig. III. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. IV. V. Pollen natius & auctus.

Erklärung der zweyhundert drey und siebenzigsten Kupfertafel.

Der eilfte Stachelschwamm.

Es ist solcher ein ein- oder zweyfärbiger, einzelner, voller, fleischiger, wenig abänderlicher Schwamm; mit einem gewölbten, schuppigen Hute; mit einem umgekehrt kegelligen Stiele. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm, mit gewölbtem, schuppigem, gleichsam nierenförmigem und in der Mitte vertieftem Hute.

Fig. II. Ein Schwamm, nach seiner Unterfläche.

Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. IV. V. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



St. L. p. R.

I. G. F. sc. R.

*Lepidus squamosus*, Schaff.  
Lepidus squamosus, Schaff.







ELVELAE.

Saltenſchwämme.



ELVELA VICESIMA PRIMA.

Est fungus sessilis, bicolor, & simplex & multiplex, cereus, fragilis, intus & extus laevis, cyathiformis, varie contortus & plicatus. *Bauari* nomen ignorant.

Fig. I. Fungi explicari incipientes.

Fig. II—VI. Varietas huius fungi, diuersae explicationis & figurae.

Fig. VII. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. VIII. IX. Pollen natius & auctus.

Erklärung der zweyhundert vier und siebenzigsten Kupfertafel.

Der ein und zwanzigste Faltenschwamm.

Es ist solcher ein stielloser, zweyfärbiger, so wohl einzelner als vielfacher, wächserner, zerbrechlicher, von aussen und innen glatter, becherartiger, auf mannigfaltige Art gewundener und gefalteter Schwamm. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Einige Schwämme, wie sie sich eben entwickeln.

Fig. II—VI. Abänderungen dieses Schwammes; nach verschiedenen Entwicklungen und Gestalt.

Fig. VII. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. VIII. IX. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VIII.



Fig. IX.



Fig. V.



Fig. VII.



Fig. VI.





Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VII.



Fig. VI.



Fig. V.



Fig. VIII.





EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE SEPTVAGESIMAE QVINTAE.

## ELVELA VICESIMA SECVNDA.

Est fungus bicolor, & solitarius & cespitosus, coriaceus, tubiformis, valde varius. Forſan varietas eluelae decimae ſeptimae, *Tab. CLXV.*

Fig. I. Fungus ore amplo.

Fig. II. III. Fungi explicari incipientes, ore fere clauſo.

Fig. IV. V. Varietates huius fungi.

Fig. VI. Fungus ad perpendicularum diſſectus.

Fig. VII. VIII. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert fünf und ſiebenzigſten Kupfertafel.

## Der zwey und zwanzigſte Faltenschwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, ſo wohl einzelner, als vielfacher, lederhafter, trompetenähnlicher, ſehr abänderlicher Schwamm. Vielleicht eine Abänderung des ſiebenzehenden Faltenschwammes. *Tab. CLXV.*

Fig. I. Ein Schwamm, mit etwas offener Mündung.

Fig. II. III. Schwämme, die ſich zu entwickeln anfangen, mit noch meiſt verſchloſſener Mündung.

Fig. IV. V. Abänderungen dieſes Schwammes.

Fig. VI. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.

Fig. VII. VIII. Der natürliche und vergrößerte Saamenſtaub.



ELVELA VICESIMA TERTIA.

Est fungus bicolor, & simplex, & multiplex, carnosus, duriusculus, clauiformis, plicatus, supra truncatus, varie incisus & excisus. Num varietas eluelae decimae sextae? *Tab. CLXIV.*

- Fig. I. Fungi quatuor connati.  
Fig. II. Fungus solitarius, ad radicem fissus.  
Fig. III. Fungus supra duplex, infra simplex.  
Fig. IV. Fungus clauam referens.  
Fig. V. Fungus floriformis.  
Fig. VI. Fungus ad perpendiculum dissectus.  
Fig. VII. VIII. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert sechs und siebenzigsten Kupfertafel.

Der drey und zwanzigste Faltenschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, so wohl einzelner als vielfacher, fleischiger, härlicher, käulartiger, gefalteter, oben abgestufter, mannigfaltig aus- oder eingeschnittener Schwamm. Vielleicht eine Abänderung des sechzehenden Faltenschwammes? *Tab. CLXIV.*

- Fig. I. Vier zusammengewachsene Schwämme.  
Fig. II. Ein einzelner, unten gespaltener Schwamm.  
Fig. III. Ein oben doppelter, unten einfacher Schwamm.  
Fig. IV. Ein käulenartiger Schwamm.  
Fig. V. Ein blumenähnlicher Schwamm.  
Fig. VI. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.  
Fig. VII. VIII. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



Fig. I.



Fig. VIII.

Fig. VII.



Fig. II.



Fig. III.



Fig.

IV.



Fig. V.



Fig. VI.

St. L. p. R.

I. G. F. sc. R.



Fig. I.



Fig. III.



Fig. II.



Fig. V.



Fig. IV.





ELVELA VICESIMA QVARTA.

Est fungus bicolor, plerumque cespitosus, coriaceus, intus & extus laevis, florem seu tubam referens. Nominem in *Bauaria* gaudet nullo.

Fig. I. Trias fungorum, variae figurae.

Fig. II. Fungi, quoad faciem exteriorem.

Fig. III. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. IV. V. Pollen nativus & auctus.

Erklärung der zweyhundert sieben und siebenzigsten Kupfertafel.

Der vier und zwanzigste Faltenschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, meistens vielfacher, lederhafter, von innen und aussen glatter, blumenartiger, oder trompetenähnlicher Schwamm. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Drey Schwämme, von verschiedener Gestalt.

Fig. II. Schwämme, wie sie sich von aussen zeigen.

Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. IV. V. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



ELVELA VICESIMA QVINTA.

Est fungus vnicolor, & solitarius & cespitosus, coriaceus, extus & intus laevis, ad oram varie excisus, florem feu tubam aemulans. In *Bauaria* nomen habet nullum.

Fig. I. Fasciculus fungorum, flores infundibuliformes aemulantium.

Fig. II. Fungus solitarius.

Fig. III. Fungus ramosus, quoad faciem posteriorem.

Fig. IV. V. Varietates huius fungi.

Fig. VI. VII. Pollen nativus & auctus.

Erklärung der zweyhundert acht und siebenzigsten Kupfertafel.

Der fünf und zwanzigste Faltenschwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger, sowohl einzelner als vielfacher, lederhafter, von aussen und innen glatter, am Rande mannigfaltig ausgeschnittener, blumen oder trompetenartiger Schwamm. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein Büschel blumentrichterartige Schwämme.

Fig. II. Ein einzelner Schwamm.

Fig. III. Ein ästiger Schwamm, nach seiner Hinterfläche.

Fig. IV. V. Abänderungen dieses Schwammes.

Fig. VI. VII. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. VI.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VII.



Fig. V.



St. L. p. R.

I. G. F. sc. R.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. I.



Fig. V.



Fig. IV.





ELVELA VICESIMA SEXTA.

Est fungus vnicolor, & solitarius & cespitosus, membranaceus, extus & intus laevis; pileo conuexo; petiolo cylindraceo. Nomine in *Bauaria* nullo.

Fig. I. Fungus ex genere agaricorum, cuius pileo eluelae insident.

Fig. II. Eluela, quoad faciem inferiorem.

Fig. III. Eluela ad perpendiculum dissecta.

Fig. IV. V. Pollen natius & auctus.

Erklärung der zweyhundert neun und siebenzigsten Kupfertafel.

Der sechs und zwanzigste Faltenschwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger, theils einzelner, theils vielfacher, von außen und innen glatter Schwamm; mit einem gewölbten Hute; und einem runden Stiele. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein Blatterschwamm, dessen Hute die Faltenschwämme aufsitzen.

Fig. II. Ein Faltenschwamm, nach der Unterfläche.

Fig. III. Ein Faltenschwamm, senkrecht zerschnitten.

Fig. IV. V. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



ELVELA VICESIMA SEPTIMA.

Est fungus sessilis, unicolor, plerumque simplex, cereus, fragilis, cauus, laevis, infra plicatus, supra varie excisus, saepe cyathiformis. *Bauari* nomen nesciunt.

Fig. I. Fungus maior, oblongus, excavatus, infra plicatus, supra excisus.

Fig. II. III. Varietates huius fungi.

Fig. IV. Fungus cyathiformis.

Fig. V. VI. Pollen nativus & auctus.

Erklärung der zweyhundert und achtzigsten Kupfertafel.

Der sieben und zwanzigste Faltenschwamm.

Es ist solcher ein stielloser, einfärbiger, meist einzelner, wachsartiger, zerbrechlicher, hohler, glatter, unten gefaltener, oben mannigfaltig ausgezackter, oft becherartiger Schwamm. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein grösserer, länglicher, ausgehöhlter, unten gefalteter, und oben zerrissener Schwamm.

Fig. II. III. Abänderungen dieses Schwammes.

Fig. IV. Ein becherartiger Schwamm.

Fig. V. VI. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. V.





Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. V.





EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE OCTOGESIMAE PRIMAE.

## ELVELA VICESIMA OCTAVA.

Est fungus bicolor, & petiolatus & sessilis, cereus, fragilis, laevis; pileo rotundo vel tricuspido. Nomen in *Bauaria* habet nullum.

Fig. I. Fungus petiolatus, capitulo tricuspido.

Fig. II. Fungus sessilis.

Fig. III. Fungus quoad faciem inferiorem.

Fig. IV. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. V. VI. Pollen nativus & auctus.

Erklärung der zweyhundert ein und achtzigsten Kupfertafel.

## Der acht und zwanzigste Faltenschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, sowohl stielloser, als bestielter, wachsartiger, gebrechlicher, glatter Schwamm; mit einem rundlichen und dreyspitzigen Hute. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein bestielter Schwamm; mit dreyspitzigem Hute.

Fig. II. Ein stielloser Schwamm.

Fig. III. Ein Schwamm; nach seiner Unterfläche.

Fig. IV. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. V. VI. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



ELVELA VICESIMA NONA.

Est fungus vnicolor, solitarius, cereus, fragilis, phalliformis; pileo inflato, plicato, in mucrones desinente; petiolo inflato, radicem versus bulbofo, extus plicato, intus fistuloso. *Bavaris* anonymus.

Fig. I. Fungus bicuspidatus.

Fig. II. Fungus tricuspidatus.

Fig. III. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. IV. V. Pollen nativus & auctus.

Erklärung der zweyhundert zwey und achtzigsten Kupfertafel.

Der neun und zwanzigste Faltenschwamm.

Es ist ein einfärbiger, einzelner, wachsartiger, gebrechlicher, unächter Morgelschwamm; mit aufgeblasenem, gefaltetem, spizig auslaufendem Hute; mit aufgeblasenem, nach unten zu knolligem, von aussen gefaltetem, von innen hohlem Stiele. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein zweyspiziger Schwamm.

Fig. II. Ein dreyspiziger Schwamm.

Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. IV. V. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.





Fig. IV.



Fig. V.







Fig. I.



Fig. II.


Fig. III.



Fig. V.



Fig. IV.





ELVELA TRICSIMA.

Est fungus vni- vel bicolor, solitarius, cereus, fragilis, phalliformis; pileo membranaceo, plicato, compresso, varie exciso, incertae figurae; petiolo compresso, curuato, saepe plicato. Nomen in *Bauaria* est nullum.

Fig. I. Fungus pileo compresso; petiolo tenui, plicato, quasi contorto.

Fig. II. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. III. Fungus maior; pileo deformi, petiolo crasso, rotundiusculo.

Fig. IV, V. Pollen nativus & auctus.

Erklärung der zweyhundert drey und achtzigsten Kupfertafel.

Der dreyßigste Faltenschwamm.

Es ist solcher ein ein- oder zweyfärbiger, einzelner, wachsartiger, zerbrechlicher, unächter Morgelschwamm; mit einem häutigen, gefalteten, gedruckten, mannigfaltig ausgeschnittenen Hute; mit einem gedruckten, gebogenenen, oft faltigen Stiele. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein Schwamm mit gedrucktem Hute; mit einem zarten, gefalteten und gleichsam gewundenen Stiele.

Fig. II. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. III. Ein grösserer Schwamm; mit ungefaltetem Hute; und einem dicken rundlichen Stiele.

Fig. IV. V. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



ELVELA TRICESIMA PRIMA.

Est fungus ex minoribus, fessilis, vnicolor, coriaceus, cyathi in formam excavatus, hemisphaericus; intus laevis, extus & in margine hirsutus, radicibus tenuissimis praeditus. Apud *Bauaros* nomen habet nullum.

Fig. I. Fungi variae figurae & magnitudinis.

Fig. II. III. Varietates huius fungi.

Fig. IV. Fungus lente auctus, quoad faciem interiorem & exteriorem.

Fig. V. Fungus quoad faciem inferiorem.

Fig. VI. Fungus radicibus tenuissimis donatus.

Fig. VII. VIII. Pollen nativus & auctus.

Erklärung der zweyhundert vier und achtzigsten Kupfertafel.

Der ein und dreyßigste Faltenschwamm.

Es ist ein kleiner, stielloser, einfärbiger, lederhafter, becherartiger, halbcirkelrunder, innwendig glatter, auswendig und am Rande haariger, bewurzelter Schwamm. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Schwämme von verschiedener Gestalt und Größe.

Fig. II. III. Abänderungen dieses Schwammes.

Fig. IV. Ein vergrößerter Schwamm, nach seiner innern und äussern Fläche.

Fig. V. Ein vergrößerter Schwamm, nach seiner Unterfläche.

Fig. VI. Ein Schwamm, mit seinen zarten Wurzeln.

Fig. VII. VIII. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.




Fig. VIII.



Fig. VII.









# CLAVARIAE.

S a u l s c h w ä m m e.



CLAVARIA DECIMA.

Est fungus coralloides, bicolor, mollis, carnosus; corpore multifido, ramoso; ramis ab initio obscuris, in apices breuissimos terminatis. In *Bauaria* nomine caret.

Fig. I. Fungus recens natus, ramis obscuris.

Fig. II. Fungus minor.

Fig. III. Ramus ad perpendicularum dissectus.

Fig. IV. Fungus euolutus, ramis multifidis.

Fig. V. Pollen nativus.

Fig. VI. Pollen auctus.

Erklärung der zweyhundert fünf und achtzigsten Kupfertafel.

Der zehende Käulschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, weicher, fleischiger, vielspaltiger, ästiger Corallenschwamm; dessen Aeste anfangs wenig sichtbar sind, und in zarte Spitzen auslaufen. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein noch nicht ausgewachsener Schwamm; mit noch unsichtbaren Aesten.

Fig. II. Ein dergleichen kleiner Schwamm.

Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Ast.

Fig. IV. Ein ausgewachsener Schwamm, mit häufigen und gespaltenen Aesten.

Fig. V. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. VI. Der vergrößerte Saamenstaub.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.





Fig. I.



Fig. III.

Fig. II.



Fig. IV.



Fig. V.

Fig. VI.





CLAVARIA VNDECIMA.

Est fungus coralloides, fere unicolor, carnosus, mollis; corpore multifido, ramoso; ramis ab initio crassis, & in apices breuissimos terminatis. In *Bauaria* nomine insignitur nullo.

Fig. I. II. Fungi diuersae figurae.

Fig. III. Ramulus integer.

Fig. IV. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. V. Pollen natiuus.

Fig. VI. Pollen auctus.

Erklärung der zweyhundert sechs und achtzigsten Kupfertafel.

Der eilfte Käulschwamm.

Es ist solcher ein meist einfärbiger, fleischiger, weicher, vielspaltiger, ästiger, Corallenschwamm; dessen Aeste einen dicklichen Anfang haben und sich in sehr kurze und kleine Spitzen endigen. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. II. Schwämme, vor verschiedenem Aussehen.

Fig. III. Ein Ast ganz und unzerschnitten.

Fig. IV. Ein Ast senkrecht zerschnitten.

Fig. V. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. VI. Der vergrößerte Saamenstaub.



CLAVARIA DVODECIMA.

Est fungus coralloides, bicolor, carnosus, mollis; corpore ramofo; ramis ab initio crassioribus vel tenuioribus, in apices breuissimos terminatis. Nomine in *Bauaria* gaudet nullo.

Fig. I. II. Fungi diuersae explicationis & figurae.

Fig. III. Ramus huius fungi.

Fig. IV. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. V. Pollen natiuus.

Fig. VI. Pollen auctus.

Erklärung der zweyhundert sieben und achtzigsten Kupfertafel.

Der zwölfte Käulschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, fleischiger, weicher, ästiger Corallenschwamm; dessen Aeste einen dicken Anfang nehmen, und in sehr kurze Spitzen auslaufen.

Fig. I. II. Schwämme von verschiedener Entwicklung und Gestalt.

Fig. III. Ein Ast dieses Schwammes.

Fig. IV. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. V. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. VI. Der vergrößerte Saamenstaub.



Fig. I.



Fig. IV.



Fig. III.



Fig. II.



Fig. V.



Fig. VI.



St. L. p. R.

I. G. F. sc. R.



Fig. I.



Fig. IV.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. VI.



St. L. p. R.

I. G. F. sc. R.



CLAVARIA DECIMA TERTIA.

Est fungus coralloides, tricolor, carnosus, mollis; corpore ramoso, ramis ab initio crassioribus vel tenuioribus in apices tenuissimos terminatis. In *Bauaria* nomen habet nullum.

Fig. I. II. Fungi diuersae explicationis & figurae.

Fig. III. Ramus huius fungi.

Fig. IV. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. V. Pollen natiuus.

Fig. VI. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert acht und achtzigsten Kupfertafel.

Der dreyzehende Käulschwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger, fleischiger, weicher, ästiger Schwamm; dessen Aeste anfangs mehr oder weniger dicke sind, und in zarte Spizen auslaufen. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. II. Schwämme von verschiedener Entwicklung und Gestalt.

Fig. III. Ein Ast dieses Schwammes.

Fig. IV. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. V. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. VI. Der vergrößerte Saamenstaub.



CLAVARIA DECIMA QVARTA.

Est fungus coralloides, vnicolor, carnosus, duriusculus; corpore multifido, ramoso; ramis in apices, & longiores & breuiores, acutos vel truncatos, terminatis, cornua ceruina optime aemulantibus. In *Bauaria* nomen desideratur.

Fig. I. Fungus, ramis acute & truncate terminatis.

Fig. II. Ramulus maior & integer.

Fig. III. Pollen natiuus.

Fig. IV. Pollen auctus.

Erklärung der zweyhundert neun und achtzigsten Kupfertafel.

Der vierzehende Käulschwamm.

Es ist solcher ein meistens einfärbiger, fleischiger, etwas harter Corallenschwamm; dessen Aeste sich theils in längere, theils in kürzere, scharfe und abgestuzte, Spizen endigen, und welche denen Hirschgeweihen ziemlich ähnlich sehen. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein Schwamm, dessen Aeste theils scharf spitzig, theils abgestuzt, auslaufen.

Fig. II. Ein etwas grosser und unzerschnittener Schwamm.

Fig. III. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. IV. Der vergrösserte Saamenstaub.



Fig. I.



Fig. IV.



Fig. III.



*Q. cornuta*

Loibl p. et Sc. Rat.





Fig. IV.



Fig. III.





EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE NONAGESIMAE.

## CLAVARIA DECIMA QUINTA.

Est fungus perpendicularis, vnicolor, solitarius, carnosus, duriusculus, gemmatus, clauam herculeam optime referens. In *Bauaria* nomen ignotum est.

Fig. I. Fungus quoad faciem inferiorem.

Fig. II. Fungus ad perpendicularum dissectus.

Fig. III. Pollen natiuus.

Fig. IV. Pollen lente auctus.

Erklärung der zweyhundert und neunzigsten Kupfertafel.

## Der funfzehende Käulschwamm.

Es ist solcher ein gerader, einfärbiger, einzelner, fleischiger, härtlicher, wie mit Edelgesteinen besetzter Schwamm, der mit einer Herculis Käule viel ähnliches hat.

Fig. I. Der Schwamm nach seinem äussern Ansehen,

Fig. II. Der senkrecht zerschnittene Schwamm.

Fig. III. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. IV. Der vergrößerte Saamenstaub.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE NONAGESIMAE PRIMAE.

### CLAVARIA DECIMA SEXTA.

Est fungus vnicolor, solitarius, non ramosus, parum carnosus, mollis, in apices tenuissimos terminatus. *Bavaris* nomen ignotum.

Fig. I. II. Fungi variae figurae.

Fig. III. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. IV. Pollen natiuus.

Fig. V. Pollen auctus.

Erklärung der zweyhundert ein und neunzigsten Kupfertafel.

### Der sechzehende Kaulschwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger, einzelner, ästenloser, wenig fleischiger und härlicher Schwamm, und der sich in sehr zarte und vielfache Spitzen zertheilt und ausläuft. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. II. Schwämme von verschiedener Gestalt.

Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. IV. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. V. Der vergrößerte Saamenstaub.





Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.

Fig. V.



*Q. coccinata*

Loibl p. et Sc. Rat.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE NONAGESIMAE SECVNDAE.

LYCOPERDON VNDECIMVM.

Est fungus vnicolor, petiolatus, & vt mihi videtur, plane deformis. Num varietas lycoperdi sexti, vel decimi quarti? *Tab. CLXXXVII. CCXCV.*

Fig. I. Fungus deformis, cuius petiolo fungi minores agariciformes adnati sunt.

Erklärung der zweyhundert zwey und neunzigsten Kupfertafel.

Der eilfte Staubschwamm.

Es ist solcher ein einfacher, bestielter, und, wie ich davor halte, ungestalteter Schwamm. Vielleicht eine Abänderung des sechsten oder vierzehenden Staubschwammes. *Tab. CLXXXVII. CCXCV.*

Fig. I. Der ungestaltete Schwamm, dessen Stiele zwey blätterschwammähnliche kleinere Schwämme angewachsen sind.



Fig. I.







Fig. II.



Fig. III.

Fig. I.



Fig. VII.



Fig. VI.



Fig. IV.

St. L. p. R.




Fig. V.

I. G. F. sc. R.



EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE NONAGESIMAE TERTIAE.

## LYCOPERDON DVODECIMVM.

Est fungus vnicolor, & petiolatus & sessilis, & piriformis & oblongus, saepe deformis; per maturitatem quoad partem superiorem in furfuraceas portiunculas, & quoad pulpam internam in pollinem farinaceum solutus; quoad partem inferiorem & petiolum persistens. In *Bauaria* nomine gaudet nullo.

Fig. I. Fungus petiolatus piriformis; capitulo marmoreo.

Fig. II. III. Fungi sessiles, oblongi; capitulis vndosis.

Fig. IV. Fungus deformis; capitulo gemmato.

Fig. V. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. VI. VII. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert drey und neunzigsten Kupfertafel.

## Der zwölfte Staubschwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger, sowohl bestielter als stielloser, sowohl birnförmiger, als länglicher Schwamm; dessen obere Hälfte sich nach und nach in allerhand kleine Stücken, das innere Wesen in einen Saamenstaub auflöset; die untere Hälfte aber, nebst dem Stiele, lange Zeit sich unverletzt erhält. Hat in *Bayern* keinen Namen.

Fig. I. Ein bestielter birnartiger Schwamm; mit gemarmertem Kopfe.

Fig. II. III. Ein stielloser länglicher Schwamm; mit gewässertem Kopfe.

Fig. IV. Ein ungestalteter Schwamm; mit gesteinertem Kopfe.

Fi. V. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. VI. VII. Der vergrößerte Saamenstaub.



LYCEPERDON DECIMVM TERTIVM.

Est fungus vnicolor, subglobosus, sessilis, petiolo tamen spurio saepe donatus, supra quasi punctatus, infra radicans; per maturitatem quoad superiorem partem solutus & difflatus, quoad inferiorem persistens; interne lanugine filamentosa & polinifera repletus. *Bavari* nomen ignorant.

Fig. I. Fungus integer, quoad faciem superiorem.

Fig. II. Fungus integer, quoad faciem inferiorem.

Fig. III. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. IV. V. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert vier und neunzigsten Kupfertafel.

Der dreyzehende Staubschwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger, rundlicher, stielloser, wenigstens nur unächt bestielter, oben gedippelter, unten bewurzelter Schwamm; dessen obere Hälfte sich nach und nach auflöst und verstiebet, die untere aber lange Zeit übrig bleibt; und dessen inneres Wesen mit einer fadigen Saamenwolle angefüllt ist. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein unverletzter Schwamm, nach seiner Oberfläche.

Fig. II. Ein unverletzter Schwamm, nach seiner Unterfläche.

Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. IV. V. Der vergrößerte Saamenstaub.





Fig. I.



Fig. V.



Fig. IV.







Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.




Fig. IV.




Fig. V.



LYCOPERDON DECIMVM QVARTVM.

Est fungus vnicolor, petiolatus; ab initio stellulis minimis obsitus, post laevis; per maturitatem in furfuraceas portiunculas, & quoad pulpam internam in pollinem farinaceum, solutus; petiolo persistente. *Bauaris* nomen est nullum.

Fig. I. Fungus recens natus, stellulis obsitus.

Fig. II. Fungus per aetatem laevis.

Fig. III. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. IV. V. Pollen lente auctus.

Erklärung der zweyhundert fünf und neunzigsten Kupfertafel.

Der vierzehende Staubschwamm.

Es ist solcher ein einfärbiger, bestielter, anfänglich zart besternter, mit der Zeit glatter Schwamm; der oben sich nach und nach in allerhand Stücken, das innere Wesen in einen Saamenstaub, auflöset, der Stiel aber sich lange Zeit erhält. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein besternter ordentlicher Schwamm.

Fig. II. Ein glatter älterer Schwamm.

Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. IV. V. Der vergrößerte Saamenstaub.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY  
540 EAST 57TH STREET  
CHICAGO, ILL. 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY  
540 EAST 57TH STREET  
CHICAGO, ILL. 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY  
540 EAST 57TH STREET  
CHICAGO, ILL. 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY  
540 EAST 57TH STREET  
CHICAGO, ILL. 60637



**MV CORES.**

**Unächte Staubschwämme.**



MV COR QVINTVS.

Est fungus ex minimis, lignarius, sessilis, globosus; recens natus argenteus, post flauescens, denique nigrescens; cortice tenui, in puluerem per aetatem fatiscens, obductus; interne polline, filamentis adhaerente, repletus. *Bauaris* anonymus.

Fig. I. Fungus recens natus, colore argenteo.

Fig. II. Fungus senior, colore flauescente.

Fig. III. Fungus maturus, colore nigrescente.

Fig. IV. V. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert sechs und neunzigsten Kupfertafel.

Der fünfte unächte Staubschwamm.

Es ist solcher ein kleiner, stielloser, kugelförmiger, anfangs silberfarbiger, nachher gelblicher, und endlich schwärzlicher Holzschwamm; dessen zarte Rinde mit der Zeit aufspringet, und den innerhalb liegenden Saamenstaub abfliegen läßt. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein erst entstandener silberfarbiger Schwamm.

Fig. II. Ein älterer gelblicher Schwamm.

Fig. III. Ein vollkommener reif gewordener schwärzlicher Schwamm.

Fig. IV. V. Der vergrößerte Saamenstaub.



Fig. I.



Fig. IV.



Fig. V.

Fig. II.



Fig. III.





Fig. I.




Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.





M V C O R S E X T V S.

Est fungus ex minimis, lignarius, petiolatus; recens natus colore carneo, maturus nigro; capitulo membrana tenuissima, per aetatem dehiscente, pollinemque eiiciente, obducto; petiolo gracili, recto vel curuato. *Bavaris* nomen est nullum.

Fig. I. Fungi recens nati, colore carneo.

Fig. II. Fungi maturi, colore nigro.

Fig. III. Trias fungorum, vitro auctorum.

Fig. IV. Fungus lente auctus, maturus, pileo dehiscente & pollinem eiiciente.

Fig. V. VI. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert sieben und neunzigsten Kupfertafel.

Der sechste Schimmelschwamm.

Es ist solcher ein kleiner, bestielter, anfangs fleischfarbiger, zuletzt schwarzer Holzschwamm; mit einem dünnhäutigen, in der Zeitfolge zerplatzenden, und den Saamenstaub von sich werfenden, Kopfe; mit einem ganzen, geraden oder gekrümmten Stiele. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Schwämme, in ihrem ersten Zeitalter, und wie sie eine Fleischfarbe haben.

Fig. II. Schwämme, in ihrer Reife, und wie sich die anfängliche Farbe in eine schwarze verwandelt hat.

Fig. III. Drey vergrößerte Schwämme.

Fig. IV. Ein reifer vergrößerter Schwamm, mit aufgesprungenem Kopfe und von sich werfendem Saamenstaube.

Fig. V. VI. Der vergrößerte Saamenstaub.







PHALLI.

Sicht- oder Seorgelschwämme.



PHALLVS TERTIVS.

Est fungus esculentus, vnicolor seu bicolor, membrana-  
ceus, cereus, fragilis, varius; capitulo cancellato, co-  
nico, acute seu obtuse terminato; intus inflato seu  
excauato; petiolo cylindraceo, laeui, ad radicem tu-  
berofo, intus fistuloso. In *Bauaria* dicitur: *Grosse Mau-  
rache*.

Fig. I. II. Fungi variae figurae.

Fig. III. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. IV. V. Pollen natiuus & vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert acht und neunzigsten Kupfertafel.

Der dritte Morgelschwamm.

Es ist solcher ein eßbarer, ein- oder zweyfärbiger, häutiger, wachsarti-  
ger, zerbrechlicher, abänderlicher Morgelschwamm; mit einem ge-  
gitterten, fegelichen, mehr und weniger spizig auslaufenden, aufge-  
blasenen, und innwendig hohlen, Kopfe; mit einem glatten, runden,  
und unten knolligen Stiele. In *Bayern* heißt er *grosse Maurache*.

Fig. I. II. Schwämme von verschiedener Gestalt.

Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. IV. V. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



Fig. IV.




Fig. V.



Fig. I.



Fig. III.

St. L. p. R.



Fig. II.

I. G. F. sc. R.



*Fig. V.*



*Fig. IV.*

*Fig. I.*



*Fig. III.*



*Fig. II.*

*St. L. p. R.*

*L. G. F. sc. R.*



PHALLVS QVARTVS.

Est fungus esculentus, bicolor, membranaceus, cereus, fragilis, varius; capitulo cancellato, & acute & obtuse terminato, inflato, intus excauato; petiolo cylindraceo, laeui, radicem versus crasso. In *Bauaria* nomine *grosse Maurache* gaudet. Num varietas fungi antecedentis?

Fig. I. II. Fungi variae figurae.

Fig. III. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. IV. Pollen natiuus.

Fig. V. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert neun und neunzigsten Kupfertafel.

Der vierte Morgelschwamm.

Es ist solcher ein eßbarer, zweyfärbiger, wachsartiger, zerbrechlicher, abänderlicher Schwamm; mit einem gegitterten, sowohl scharf spizig, als auch stumpf spizig, auslaufenden, aufgeblasenen, innwendig hohlen Kopfe; mit einem runden, glatten, nach unten zu dickeren Stiele. Ist in Bayern unter dem Namen *grosse Maurache* bekannt.

Fig. I. II. Schwämme von verschiedener Gestalt.

Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. IV. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. V. Der vergrößerte Saamenstaub.



PHALLVS QVINTVS.

Est fungus esculentus, bicolor, membranaceus, cereus, fragilis, varius; capitulo cancellato, conico, rotunde acuminato, inflato, intus cauo, saepe deformi; petiolo cylindraceo, tuberoso, intus fistuloso. In *Bauaria* appellatur *grosse Maurache*.

Fig. I. Fungus capitulo conico, rotunde acuminato.

Fig. II. Fungus capitulo deformi, elueliformi.

Fig. III. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. IV. Pollen natiuus.

Fig. V. Pollen lente auctus.

Erklärung der dreyhundersten Kupfertafel.

Der fünfte Morgelschwamm.

Es ist solcher ein eßbarer, zweyfärbiger, häutiger, wachsartiger, zerbrechlicher, abänderlicher Schwamm; mit gegittertem, kegeligem, rundlich zugespitztem, aufgeblasenem, innwendig hohlem, oft ungestaltetem Kopfe; mit einem runden, aufgeblasenen, innwendig hohlen Stiele. Heisset in Bayern insgemein *grosse Maurache*.

Fig. I. Ein Schwamm, mit kegeligen, rundlich spitzig auslaufenden Kopfe.

Fig. II. Ein Schwamm, mit einem ungestalteten, Faltenschwammähnlichen Kopfe.

Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. IV. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. V. Der vergrößerte Saamenstaub.





Fig.V




Fig.IV.



Fig.I.



Fig.II.



Fig.III.



















KREISBIBLIOTHEK  
REGENSBURG



















Schaeffer, Jacob Christian,

D. Iacobi Christiani Schaeffer Fvngorum Qvi In Bavaria Et Palatinatv Circa  
Ratisbonam Nascvntur Icones Nativis Coloribvs Expressae

Bd.: 3

Ratisbonae 1772

Regensburg, Staatliche Bibliothek -- 999 IM/Philos.2886(3  
urn:nbn:de:bvb:12-bsb11120625-6